► La kinase IKKε, membre atypique de la famille des kinases IKK, a récemment été reconnue comme étant un oncogène majeur surexprimé dans une large proportion de cancers du sein. Outre son rôle dans la régulation du facteur de transcription NF-κB, dont l'action dans le développement du cancer du sein est largement établie, IKKε participe à la phosphorylation de divers substrats. L'identification de certains de ces substrats a permis de trouver des voies oncogéniques qui pourraient constituer des cibles thérapeutiques. De plus, IKKε semble jouer un rôle dans la résistance au tamoxifène. Ces nouvelles données ouvrent des perspectives prometteuses en vue de la mise au point de thérapies ciblant IKKε dans les cancers du sein. ◀

Le cancer du sein est une cause majeure de mortalité chez la femme. L'apparition et la progression des carcinomes mammaires sont des processus multi-étapes dans lesquels entre en jeu une dérégulation génétique des mécanismes de survie et de prolifération cellulaires. La complexité et l'hétérogénéité biologiques des cancers du sein compliquent le repérage de gènes et de voies de signalisation susceptibles de servir de biomarqueurs diagnostiques et de supports aux stratégies thérapeutiques.

Une activation aberrante de la voie de signalisation conduisant à l'activation du facteur de transcription *nuclear factor* (NF)-κB intervient à différentes étapes du développement du cancer du sein : la prolifération, l'invasion, l'angiogenèse, l'inhibition de l'apoptose et le processus métastatique [1]. Les membres fondateurs de la famille des kinases IκB kinase (IKK) sont les kinases IKKα et IKKβ, dont le rôle central dans la régulation du facteur NF-κB a été largement décrit [2]. Cette famille de kinases a par la suite été élargie pour inclure les kinases IKKε/IKKi et *TANK binding kinase 1* (TBK1)/*NF-κB-activated kinase* (NAK), qui jouent un rôle important dans la régulation des voies de signalisation qui contrôlent notamment l'immunité

La kinase IKKε

De l'oncogénèse à la résistance au traitement du cancer du sein

Nathalie Grandvaux

Chaire de recherche du Canada en signalisation et infections virales, centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM), Hôpital Saint-Luc, 264, boulevard René Lévesque Est, PEA 311 Montréal (Québec), H2X 1P1 Canada ; Département de biochimie, Faculté de médecine, Université de Montréal, Québec, Canada. nathalie.grandvaux@umontreal.ca

innée, l'angiogenèse et l'oncogénèse [3]. Les études récentes, qui sont détaillées dans cet article, ont permis de mettre en évidence un rôle majeur de la kinase IKKε dans l'oncogénèse associée au cancer du sein, ainsi que dans le développement de résistances au traitement par le tamoxifène. Ces nouvelles données ouvrent des perspectives prometteuses susceptibles de conduire à des thérapies ciblant IKKε et, de là, à de nouveaux traitements des cancers du sein.

IKKε, un membre de la famille des kinases IKK

La kinase IKKε a initialement été caractérisée par hybridation sous-traitive dans les macrophages de souris stimulés ou non par le lipopolysaccharide (LPS) [4]. Son expression est stimulée par le LPS. Par la suite, une étude *in silico* par alignement de séquences a démontré l'homologie d'IKKε avec les kinases IKKα et IKKβ [5]. Tout comme les autres membres de la famille des IKK, IKKε présente un domaine Ser/Thr kinase à l'extrémité amino-terminale, qui lui confère sa fonction de phosphorylation des substrats, ainsi qu'un motif amphipathique leucine-*zipper like* et un domaine carboxy-terminal de type hélice-boucle-hélice dont les fonctions dans son interaction avec des substrats ou des régulateurs n'ont pas encore été déterminées (Figure 1). Cependant, les propriétés enzymatiques d'IKKε diffèrent de celles des autres IKK, son plus proche homologue étant TBK1 [6].

Alors que les gènes codant pour les kinases IKKα, IKKβ et TBK1 sont, à notre connaissance, exprimés de manière constitutive et ubiquitaire, le gène codant pour IKKε, *IKBKE*, se singularise par une expression dépendante du type cellulaire. *IKBKE* est constitutivement exprimé

Figure 1. Structure-fonction d'IKK ϵ . La structure globale d'IKK ϵ est similaire à celle de TBK1, IKK α et IKK β avec un domaine kinase en amino-terminal et un motif leucine-zipper (LZ), et un motif hélice-boucle-hélice (HBH) en carboxy-terminal. Le domaine kinase d'IKK ϵ possède des degrés variables avec les autres membres de la famille IKK, ce qui définit sa spécificité par rapport à la séquence cible optimale.

dans des organes et cellules du système immunitaire comme le pancréas, le thymus, la rate et les leucocytes du sang périphérique [4, 5]. En revanche, de nombreuses données ont démontré que, dans les autres types cellulaires, l'expression de *IKBKE* est déclenchée par des stimulus et des cytokines pro-inflammatoires comme le LPS, le phorbol myristate acétate (PMA) et le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF α) [4, 5, 7-9]. Les mécanismes de la régulation transcriptionnelle d'*IKBKE* sont encore peu connus, mais son induction par le TNF α et l'interleukine 1 β met en jeu la liaison de la sous-unité p65 de NF- κ B sur les sites κ B présents dans le promoteur d'*IKBKE* [10].

Très récemment, les travaux du groupe de L. C. Cantley ont permis de caractériser un motif optimal, X-X-X-Y/F/P/M-X-pS-L/I/M/F-X-Y/W/F-X, de phosphorylation par IKK ϵ . En utilisant ce motif par une technique bio-informatique, plusieurs substrats potentiels d'IKK ϵ ont été identifiés [11]. En revanche, pour d'autres substrats d'IKK ϵ , comme I κ B α ou le récepteur de l'œstrogène α (ER α), les sites contenus dans les séquences ciblées par la kinase ne correspondent pas à ce motif [4, 12], suggérant que ce motif linéaire caractérisé *in vitro* ne reflète pas totalement la sélectivité d'IKK ϵ qui semble être moins forte *in vivo*.

IKK ϵ régule l'activité de plusieurs facteurs de transcription

Le rôle des kinases IKK α et IKK β dans les voies dites canonique et non canonique d'activation du facteur NF- κ B a été largement étudié et décrit dans de nombreuses études [2, 34]. La famille des facteurs NF- κ B est composée des sous-unités de NF- κ B, NF- κ B1 (p50), NF- κ B2 (p52), RelA (p65), RelB et cRel, les sous-unités p50 et p52 étant produites par protéolyse respectivement des précurseurs p105 et p100 par le protéasome. Brièvement, en l'absence de signaux spécifiques, les sous-unités de NF- κ B sont séquestrées sous forme de dimères dans le cytoplasme par leur association avec les inhibiteurs de la famille I κ B (I κ B α , I κ B β , I κ B ϵ , p100, p105, BCL3, I κ B ζ , et I κ BNS). Il est important de noter que les sous-unités p105 et p100 agissent comme inhibiteurs avant d'être protéolysées et de former les sous-unités actives p50 et p52. La voie canonique, engagée par de multiples stimulus incluant les cytokines pro-inflammatoires, les produits microbiens et le stress, se caractérise par l'activation du complexe kinase IKK, constitué des kinases IKK α et IKK β et de la sous-unité régulatrice

IKK γ /NEMO qui phosphoryle I κ B α sur les résidus Ser32 et Ser36 provoquant ainsi son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome [35]. La voie non canonique est activée spécifiquement par des membres de la famille des TNF incluant le CD40L, la lymphotoxine- $\alpha\beta$, le facteur d'activation des lymphocytes B (BAFF), l'inducteur d'apoptose TWEAK (*TNF-related weak inducer of apoptosis*), ainsi que le ligand RANKL (*Receptor activator for nuclear factor κ B ligand*). Cette voie fonctionne indépendamment d'IKK β et IKK γ , mais met en jeu l'activation de la kinase IKK α qui phosphoryle le précurseur p100 qui sera partiellement dégradé par le protéasome pour former la sous-unité p52. La dégradation des I κ B permet l'exposition d'une séquence de localisation nucléaire (NLS) des sous-unités NF- κ B entraînant leur accumulation dans le noyau, ainsi que la liaison à l'ADN d'une séquence consensus présente dans le promoteur des gènes cibles et leur transactivation [2, 13].

Contrairement à IKK α et β , le rôle d'IKK ϵ dans la régulation de la voie canonique reste énigmatique (Tableau 1). Les premières études, majoritairement réalisées dans des conditions de surexpression, suggéraient un rôle majeur d'IKK ϵ dans l'activation de NF- κ B et de ses gènes cibles [4, 5], mais les études ultérieures réalisées sur des souris déficientes en IKK ϵ n'ont pas confirmé cette hypothèse [14, 15]. De nombreuses études continuent pourtant de suggérer qu'IKK ϵ intervient dans l'activation de NF- κ B. Bien que son rôle dans la voie canonique soit controversé compte tenu qu'IKK ϵ ne phosphoryle que la Ser36 d'I κ B α , certaines études démontrent qu'une ablation d'IKK ϵ inhibe la dégradation d'I κ B α [5, 16, 17]. D'autre part, IKK ϵ phosphoryle la protéine adaptatrice *TRAF family member-associated NF- κ B activator* (TANK), conduisant à la libération de l'ubiquitine ligase TRAF2 et à l'activation du complexe IKK $\alpha/\beta/\gamma$ [18]. Il est dorénavant accepté que les modifications post-traductionnelles des sous-unités NF- κ B jouent un rôle prépondérant dans leur activation. Les principales modifications post-traductionnelles sont la phosphorylation, l'acétylation, l'oxydation

Substrat	Site cible	Stimulus / type cellulaire	Fonction
Cascade d'activation de NF-κB			
TANK	ND	Expression ectopique	Dissociation de TRAF2 Activation de NF- κ B
I κ B α	Ser36	PMA, stimulation du TCR/cellules T	ND
p65	Ser468	PMA + ionomycine /cellules T TNF/fibroblastes murins	Stimule l'accumulation nucléaire
p65	Ser536	Constitutive/cellules cancéreuses	Stimule l'activité transactivatrice
cRel	ND – dans le domaine de transactivation.	Expression ectopique	Dissociation du complexe cRel/I κ B α Localisation nucléaire de cRel
c-jun	ND	Cytokines pro-inflammatoires ; LPS/synoviocytes	Inflammation
	ND	LPS	Déplacement de l'inhibiteur NCoR
STAT1	Ser708, Ser744, Ser747	Infection par VSV/fibroblastes murins	Activation de la réponse interféron
Famille IRF			
IRF-3	Ser396, Ser402	Infections virales/multiples types cellulaires	Activation de la réponse interféron
IRF-7	Ser477, Ser479	Infections virales/multiples types cellulaires	Activation de la réponse interféron

Tableau 1. Liste des substrats d'IKK ϵ caractérisés en dehors du contexte du cancer du sein. ND : non déterminé.

et l'ubiquitination. Ces modifications permettent non seulement une régulation fine de l'activation des dimères NF- κ B en aval des voies canoniques et non canoniques, mais également une activation alternative des sous-unités p65 et cRel. IKK ϵ phosphoryle p65 sur les Ser468 et Ser536, deux phosphorylations qui contrôlent respectivement l'accumulation nucléaire et la capacité transactivatrice [19, 20]. La phosphorylation de la sous-unité cRel par IKK ϵ conduit à une dissociation du complexe cRel/I κ B α , indépendamment de la dégradation d'I κ B α . Cette dissociation, qui résulte probablement d'un changement de conformation, permet l'exposition du NLS (*nuclear localization sequence*) et l'accumulation nucléaire de cRel [21].

Si le rôle joué par IKK ϵ dans la régulation de la voie de signalisation conduisant à l'activation de NF- κ B n'est pas encore totalement élucidé, sa fonction dans la régulation d'autres facteurs de transcription est quant à elle mieux caractérisée (Tableau 1). IKK ϵ joue ainsi un rôle majeur dans l'immunité innée médiée par les interférons (IFN). IKK ϵ , tout comme son homologue TBK1, est responsable de la phosphorylation des facteurs de transcription IRF-3 (*interferon responsive factor*) et IRF-7 qui exercent un rôle-clé dans la transcription des gènes codant pour les IFN de types I et III [22, 23]. Les IFN agissent de façon autocrine et paracrine sur les cellules pour activer le complexe ISGF3 (STAT1/STAT2/IRF-9) qui orchestre l'expression de multiples gènes dont les produits régulent notamment la traduction, l'apoptose et la prolifération cellulaire. L'expression d'IKK ϵ est amplifiée par les IFN.

De plus, IKK ϵ contribue à l'activation du facteur ISGF3 via la phosphorylation de STAT1 [8]. Dans le contexte inflammatoire, IKK ϵ phosphoryle et active également c-jun en réponse aux cytokines pro-inflammatoires et au LPS dans les synoviocytes humains [9]. La phosphorylation de c-jun par IKK ϵ est également requise dans le déplacement de l'inhibiteur de transcription NCoR en réponse au LPS [24].

IKK ϵ : un nouvel oncogène majeur du cancer du sein

Arguments pour l'implication de IKK ϵ dans les cancers

À l'instar d'IKK α et IKK β , dont le rôle dans différents cancers a été largement décrit, des études récentes ont mis en lumière une surexpression d'IKK ϵ dans divers cancers, notamment les cancers de la prostate, des ovaires et du sein [16, 17, 19, 25, 26]. Dès 2005, le groupe de G. E. Sonenshein a mis en évidence une expression et une activité aberrantes d'IKK ϵ dans des tumeurs primaires et diverses lignées humaines de cancer du sein, ainsi que dans des tumeurs mammaires de souris provoquées par le 7, 12-diméthylbenzène(a)

anthracène (DMBA) [17]. En accord avec cette surexpression, une augmentation du nombre de copies de la région chromosomique 1q32 qui inclut le locus du gène *IKKε* a été observée dans plus de 16 % des 49 lignées cellulaires humaines de cancer du sein étudiées et dans 33 % des 30 tumeurs primaires humaines analysées [16]. Cependant, l'augmentation du nombre de copies de la région 1q32 n'explique pas toujours la surexpression d'IKKε, tant au niveau de l'ARNm que de la protéine puisqu'une surexpression d'IKKε est observée dans un nombre significatif de lignées et d'échantillons tumoraux humains en l'absence de modification du nombre de copies de la région 1q32 [16]. Cette observation pourrait s'expliquer par une régulation aberrante de l'expression d'IKKε au stade transcriptionnel. En effet, il a été observé que la surexpression de la Ser/Thr kinase CK2 dans les cellules de cancer du sein est essentielle pour l'expression d'IKKε selon un mécanisme qui n'est pas encore élucidé [17].

Les premières données démontrant un rôle d'IKKε dans le développement du cancer du sein ont révélé que sa suppression réduit la capacité des cellules de cancer du sein à croître dans un milieu *soft-agar* – un phénotype caractéristique des cellules malignes – ainsi que leur capacité à former des colonies invasives lorsqu'elles sont cultivées sur Matrigel [17]. Par la suite, le rôle d'IKKε a été clairement établi dans une étude très élégante intégrant un criblage d'une banque de 256 kinases actives dans un système de transformation cellulaire dépendant de H-RAS, ainsi qu'un criblage utilisant une banque de 6 144 shARN ciblant 1 200 gènes, dont 93 % du kinome¹ humain. Cette étude a permis de démontrer que la surexpression d'IKKε déclenche, en coopération avec la voie de signalisation dépendante de la kinase MEK, la transformation de cellules humaines en aval de la voie de signalisation Ras-PI3K-Akt, et que la suppression d'IKKε dans les lignées de cancer du sein présentant une augmentation du nombre de copies provoque la mort cellulaire [16].

Des expériences de suppression d'expression et d'inhibition de l'activité kinase au moyen de l'expression d'un mutant dominant négatif ont permis d'attester le rôle d'IKKε dans la régulation de l'expression de gènes codant pour des facteurs contribuant à la survie et à la prolifération cellulaire. Il s'agit des gènes cibles suivants : le gène *CCND1* codant pour la cycline D1 essentielle dans la transition G1/S du cycle cellulaire [17], le gène codant pour la métalloprotéinase-9 (MMP-9) importante dans l'angiogenèse, ainsi que le gène codant pour le facteur anti-apoptotique Bcl-2 [16].

Phosphorylation de facteurs de transcription d'une voie IKKε/NF-κB et oncogénèse

Le rôle-clé d'IKKε dans la phosphorylation des facteurs de transcription IRF-3/7 et STAT1 suggère que ces voies exercent un rôle dans l'oncogénèse médiée par IKKε. Cependant, la phosphorylation d'IRF-3 n'a pas été détectée dans les différentes lignées de cancer du sein qui surexpriment IKKε, ce qui semble écarter toute action d'IRF-3 [16]. L'activation d'IRF-7 et de STAT1 n'a, à notre connaissance, pas été étudiée dans ce contexte. NF-κB joue un rôle dans diverses étapes

du développement du cancer du sein, mais la fonction spécifique des différentes sous-unités reste peu connue [1]. Il est particulièrement intéressant de noter que l'accumulation dans le noyau de la sous-unité cRel de NF-κB est une caractéristique des cellules de cancer du sein lors de la transformation de glandes mammaires de souris [27, 28]. J.S. Boehm et collaborateurs ont démontré que la localisation nucléaire de cRel corrèle positivement avec le niveau d'expression d'IKKε dans les tumeurs primaires [16]. Cette corrélation suggère que la surexpression d'IKKε pourrait entraîner la localisation nucléaire de cRel via la voie alternative indépendante de la dégradation d'IκBα qui met en jeu la phosphorylation directe de cRel [21]. D'autre part, la phosphorylation de p65 sur la Ser536 par IKKε contribue à la prolifération cellulaire comme cela a été démontré dans des cellules HeLa, ce qui suggère que cette voie pourrait jouer un rôle dans la prolifération des cellules de cancer du sein [19]. De plus, lors d'expériences de suppression d'IKKε dans des cellules de cancer du sein, une incidence sur l'activité du promoteur de RelB a été observée [17]. Bien que l'ensemble de ces données suggère une fonction d'une voie IKKε/NF-κB, le rôle de la phosphorylation de facteurs de transcription par IKKε dans la prolifération des cellules de cancer du sein reste encore incertain.

Phosphorylation de CYLD par IKKε et oncogénèse

En dehors des facteurs de transcription, IKKε phosphoryle d'autres catégories de protéines qui ont des fonctions majeures dans le développement du cancer du sein. À cet égard, le groupe de L. C. Cantley a déterminé que la déubiquitine *cylindromatosis tumour suppressor* (CYLD), un suppresseur de tumeur, est un substrat d'IKKε (voir M. Bonnet et G. Courtois, ce numéro [36]). La phosphorylation de CYLD sur la Ser418 par IKKε inhibe son activité déubiquitine, ce qui facilite la transformation des cellules par IKKε [11] (Figure 2). Cependant, l'abrogation de cette phosphorylation par l'expression d'un mutant non phosphorylable de CYLD n'inhibe pas totalement la capacité d'IKKε à transformer les cellules. Ceci suggère que CYLD n'est pas le seul substrat d'IKKε exerçant un rôle dans la transformation. D'autre part, les cibles de CYLD dans la voie d'oncogénèse dépendante d'IKKε restent à déterminer. Il est toutefois intéressant de noter que CYLD agit comme répresseur des voies de signalisation conduisant à l'activation de NF-κB en inhibant différentes cibles moléculaires, en particulier les ubiquitines ligases TRAF2 et TRAF6, la sous-unité IKKγ ou le facteur Bcl-3 [29]. Le rôle de CYLD dans la régulation de NF-κB semble pertinent dans le contexte du cancer du sein puisqu'il a été observé que la phosphorylation de CYLD sur la

¹ Ensemble des gènes qui contrôlent toutes les kinases humaines.

Figure 2. Rôle d'IKKε dans le développement du cancer du sein. Le récepteur de l'œstrogène α (ERα) et la déubiquitineuse CYLD sont des substrats d'IKKε dans les carcinomes mammaires. Dans les cellules ERα⁺, la phosphorylation d'ERα active sa capacité transactivatrice, notamment dans la régulation du gène *CCND1*, mais est également en cause dans l'instauration d'une résistance au traitement par le tamoxifène. D'autre part, IKKε phosphoryle CYLD, qui agit classiquement comme suppresseur de tumeur, pour la rendre inactive. Les conséquences directes de l'inactivation de CYLD sont peu caractérisées mais favorisent néanmoins l'activation de NF-κB. Ces voies contribuent à accroître la capacité d'IKKε à susciter la prolifération et la survie des cellules mammaires. Les gènes *CCND1*, *Bcl-2* et *MMP-9* sont dépendants de l'activation d'IKKε. D'autres substrats d'IKKε qui restent à découvrir participent certainement à ces régulations.

Ser418 déclenche une augmentation de l'activité de NF-κB [11]. Il est particulièrement intéressant de noter que l'ablation de l'expression de CYLD provoque une activation constitutive d'IKKε dans les cellules dendritiques et dans des fibroblastes embryonnaires humains [30]. Bien que cette relation fonctionnelle n'ait pas été démontrée dans le contexte de cellules de cancer du sein, il est tentant de penser que l'inhibition de l'activation de CYLD via la phosphorylation par IKKε exerce un rôle de *feed-back* en amplifiant l'activation constitutive de IKKε.

Les cancers du sein exprimant ERα (ERα⁺) représentent 70 % des tumeurs [31]. Aucune corrélation n'a été observée entre la surexpression d'IKKε et l'expression d'ERα, mais IKKε active les fonctions de transactivation d'ERα via la phosphorylation directe de la Ser167 déclenchant ainsi l'expression du gène *CCND1* [12]. IKKε est également

associée à la régulation de *CCND1* dans les cellules ERα⁻ par l'intermédiaire d'un mécanisme indépendant d'ERα. Comme NF-κB contribue à la régulation du gène *CCND1*, il est envisageable que dans ces cellules ERα⁻, la voie IKKε/NF-κB soit un des relais possibles [12] (Figure 2).

IKKε comme cible thérapeutique : limiter la croissance tumorale et l'instauration de résistances

Les données attestant le rôle d'IKKε dans l'oncogénèse des cellules mammaires décrites ci-dessus suggèrent fortement que l'élaboration d'un inhibiteur d'IKKε représente une voie de recherche prometteuse dans le traitement de certains cancers du sein. Les résultats obtenus très récemment par l'équipe de J.Q. Cheng étayent non seulement cette hypothèse, mais suggèrent aussi fortement que l'idée de cibler IKKε pourrait améliorer les thérapies actuelles [12]. En effet, les cancers du sein ERα⁺ présentent

un meilleur pronostic que les tumeurs ERα⁻ du fait de leur sensibilité à des molécules anti-œstrogéniques, comme le tamoxifène, ou des molécules ayant pour effet de diminuer le taux d'œstrogènes, comme le letrozole, l'anastrozole ou l'exemestane. Le tamoxifène est prépondérant dans l'arsenal actuel contre le cancer du sein, cependant certaines tumeurs développent une résistance à ce composé. Dans certains cas, cette résistance est associée à la phosphorylation d'ERα par diverses kinases [31] et il a été démontré que la phosphorylation de la Ser167 d'ERα par IKKε participe à la résistance au tamoxifène. En effet, l'interférence avec l'expression d'IKKε rend les

cellules de cancer du sein plus sensibles à la mort cellulaire provoquée par le tamoxifène. En revanche, l'expression ectopique d'IKKε protège les cellules de cet effet [12]. Ces résultats renforcent l'intérêt de mettre au point des inhibiteurs spécifiques d'IKKε, non seulement afin de pouvoir compter sur de nouvelles thérapies, mais également pour prévenir l'instauration de résistance au tamoxifène. L'activation constitutive et le rôle prépondérant de NF-κB dans la cancérogenèse (prolifération, invasion, angiogenèse, inhibition de l'apoptose et phénomène métastatique) expliquent les nombreuses recherches visant à produire des inhibiteurs pharmacologiques de ses voies d'activation [32]. Cependant, la majorité des inhibiteurs actuellement en phase clinique visent IKKβ et, pour certains, IKKα [32]. Une première molécule, le BX795, a été reconnue comme un inhibiteur d'IKKε et de TBK1. Cependant, sa spécificité reste limitée [33]. Au vu des données rapportées ces récentes années, il semble important qu'un effort majeur soit fait pour mettre au point de petites molécules inhibitrices qui aient pour cible exclusive IKKε. Ces molécules pourraient notamment être utilisées en association avec les traitements de chimiothérapie utilisant le tamoxifène afin de limiter les perspectives de résistances. ♦

SUMMARY

The IKKε kinase in breast cancer: from oncogenesis to treatment resistance

The IKKε kinase, an atypical member of the IKK family of kinases, was recently identified as an oncogene overexpressed in over 30% of breast cancers. Besides its role in the regulation of the NF-κB transcription factor, which is well recognized for its implication in the development of breast cancers, IKKε was shown to phosphorylate numerous targets. Analysis of the phosphorylation of some of these substrates in the context of breast cancer highlighted new oncogenic signaling pathways that constitute potential targets for new therapies. Interestingly, IKKε is involved in the development of resistance to Tamoxifène. Thus, IKKε is a promising therapeutic target for newly developed breast cancer treatment. ♦

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts concernant les données publiées dans cet article.

REMERCIEMENTS

Ce travail a été financé par des fonds des Instituts de recherche en santé du Canada et de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du sein (CBCRA-019797 et CIHR/CBCRA MOP-102622) alloués à Nathalie Grandvaux. L'auteure est récipiendaire d'une chaire de recherche du Canada Tier II.

RÉFÉRENCES

1. Wu JT, Kral JG. The NF-kappaB/IkappaB signaling system: a molecular target in breast cancer therapy. *J Surg Res* 2005 ; 123 : 158-69.
2. Hayden MS, Ghosh S. Shared principles in NF-kappaB signaling. *Cell* 2008 ; 132 : 344-62.
3. Clement JF, Meloche S, Servant MJ. The IKK-related kinases: from innate immunity to oncogenesis. *Cell Res* 2008 ; 18 : 889-99.
4. Shimada T, Kawai T, Takeda K, et al. IKK-i, a novel lipopolysaccharide-inducible kinase that is related to IkappaB kinases. *Int Immunol* 1999 ; 11 : 1357-62.
5. Peters RT, Liao SM, Maniatis T. IKKepsilon is part of a novel PMA-inducible IkappaB kinase complex. *Mol Cell* 2000 ; 5 : 513-22.
6. Kishore N, Huynh QK, Mathialagan S, et al. IKK-i and TBK-1 are enzymatically distinct from the homologous enzyme IKK-2: comparative analysis of recombinant human IKK-i, TBK-1, and IKK-2. *J Biol Chem* 2002 ; 277 : 13840-7.
7. Kravchenko VV, Mathison JC, Schwamborn K, et al. IKKi/IKKepsilon plays a key role in integrating signals induced by pro-inflammatory stimuli. *J Biol Chem* 2003 ; 278 : 26612-9.
8. Tenoever BR, Ng SL, Chua MA, et al. Multiple functions of the IKK-related kinase IKKepsilon in interferon-mediated antiviral immunity. *Science* 2007 ; 315 : 1274-8.
9. Sweeney SE, Hammaker D, Boyle DL, Firestein GS. Regulation of c-Jun phosphorylation by the IkappaB kinase-epsilon complex in fibroblast-like synoviocytes. *J Immunol* 2005 ; 174 : 6424-30.
10. Wang N, Ahmed S, Haqqi TM. Genomic structure and functional characterization of the promoter region of human IkappaB kinase-related kinase IKKi/IKKvarepsilon gene. *Gene* 2005 ; 353 : 118-33.
11. Hutti JE, Shen RR, Abbott DW, et al. Phosphorylation of the tumor suppressor CYLD by the breast cancer oncogene IKKepsilon promotes cell transformation. *Mol Cell* 2009 ; 34 : 461-72.
12. Guo JP, Shu SK, Esposito NN, et al. IKKepsilon phosphorylation of estrogen receptor alpha Ser-167 and contribution to tamoxifen resistance in breast cancer. *J Biol Chem* 2010 ; 285 : 3676-84.
13. Vallabhapurapu S, Karin M. Regulation and function of NF-kappaB transcription factors in the immune system. *Annu Rev Immunol* 2009 ; 693-733.
14. Perry AK, Chow EK, Goodnough JB, et al. Differential requirement for TANK-binding kinase-1 in type I interferon responses to toll-like receptor activation and viral infection. *J Exp Med* 2004 ; 199 : 1651-8.
15. Hemmi H, Takeuchi O, Sato S, et al. The roles of two IkappaB kinase-related kinases in lipopolysaccharide and double stranded RNA signaling and viral infection. *J Exp Med* 2004 ; 199 : 1641-50.
16. Boehm JS, Zhao JJ, Yao J, et al. Integrative genomic approaches identify IKKε as a breast cancer oncogene. *Cell* 2007 ; 129 : 1065-79.
17. Eddy SF, Guo S, Demicco EG, et al. Inducible IkappaB kinase/IkappaB kinase epsilon expression is induced by CK2 and promotes aberrant nuclear factor-kappaB activation in breast cancer cells. *Cancer Res* 2005 ; 65 : 11375-83.
18. Nomura F, Kawai T, Nakanishi K, Akira S. NF-kappaB activation through IKK-i-dependent I-TRAF/TANK phosphorylation. *Genes Cells* 2000 ; 5 : 191-202.
19. Adli M, Baldwin AS. IKK-i/IKKepsilon controls constitutive, cancer cell-associated NF-kappaB activity via regulation of Ser-536 p65/RelA phosphorylation. *J Biol Chem* 2006 ; 281 : 26976-84.
20. Mattioli I, Geng H, Sebald A, et al. Inducible phosphorylation of NF-kappaB p65 at serine 468 by T cell costimulation is mediated by IKK epsilon. *J Biol Chem* 2006 ; 281 : 6175-83.
21. Harris J, Olierie S, Sharma S, et al. Nuclear accumulation of cRel following C-terminal phosphorylation by TBK1/IKKepsilon. *J Immunol* 2006 ; 177 : 2527-35.
22. Sharma S, tenOever BR, Grandvaux N, et al. Triggering the interferon antiviral response through an IKK-related pathway. *Science* 2003 ; 300 : 1148-51.
23. Fitzgerald KA, McWhirter SM, Faia KL, et al. IKKepsilon and TBK1 are essential components of the IRF3 signaling pathway. *Nat Immunol* 2003 ; 4 : 491-6.
24. Huang W, Ghisletti S, Perissi V, et al. Transcriptional integration of TLR2 and TLR4 signaling at the NCoR derepression checkpoint. *Mol Cell* 2009 ; 35 : 48-57.
25. Seo SI, Song SY, Kang MR, et al. Immunohistochemical analysis of NF-kappaB signaling proteins IKKepsilon, p50/p105, p52/p100 and RelA in prostate cancers. *Apmis* 2009 ; 117 : 623-8.
26. Guo JP, Shu SK, He L, et al. Deregulation of IKKε is associated with tumor progression, poor prognosis, and cisplatin resistance in ovarian cancer. *Am J Pathol* 2009 ; 175 : 324-33.

RÉFÉRENCES

27. Sovak MA, Bellas RE, Kim DW, *et al.* Aberrant nuclear factor-kappaB/Rel expression and the pathogenesis of breast cancer. *J Clin Invest* 1997 ; 100 : 2952-60.
28. Romieu-Morez R, Kim DW, Shin SM, *et al.* Mouse mammary tumor virus c-rel transgenic mice develop mammary tumors. *Mol Cell Biol* 2003 ; 23 : 5738-54.
29. Sun SC. CYLD: a tumor suppressor deubiquitinase regulating NF-kappaB activation and diverse biological processes. *Cell Death Differ* 2010 ; 17 : 25-34.
30. Zhang M, Wu X, Lee AJ, *et al.* Regulation of IkappaB kinase-related kinases and antiviral responses by tumor suppressor CYLD. *J Biol Chem* 2008 ; 283 : 18621-6.
31. Barone I, Brusco L, Fuqua SA. Estrogen receptor mutations and changes in downstream gene expression and signaling. *Clin Cancer Res* 2010 ; 16 : 2702-8.
32. Lee DF, Hung MC. Advances in targeting IKK and IKK-related kinases for cancer therapy. *Clin Cancer Res* 2008 ; 14 : 5656-62.
33. Clark K, Plater L, Pegg M, Cohen P. Use of the pharmacological inhibitor BX795 to study the regulation and physiological roles of TBK1 and IkappaB kinase epsilon: a distinct upstream kinase mediates Ser-172 phosphorylation and activation. *J Biol Chem* 2009 ; 284 : 14136-46.
34. Baud V, Jacque E. The alternative NF-kB activation pathway and cancer: friend or foe? *Med Sci (Paris)* 2008 ; 24 : 1083-8.
35. Gautheron J, Courtois G. New functions of NEMO, the regulatory subunit of IKK. *Med Sci (Paris)* 2008 ; 24 : 954-9.
36. Bonnet M, Courtois G. La déubiquitinase CYLD : une cible récurrente dans les processus oncogéniques. *Med Sci (Paris)* 2011 ; 27 : 626-31.

TIRÉS À PART

N. Grandvaux

***Integrated solutions that support
science from start to finish.***

Already an established leader in cellular analysis research products, now find out how Promega can be your trusted resource for detection instrumentation.

To learn more about Promega Integrated Solutions, call toll-free 0800 48 79 99.

www.promega.com

INTEGRATED SOLUTIONS
Instruments | Reagents | Software | Support

©2011 PROMEGA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 5/11. 20151