TREKlight révèle que TREK1 est impliqué dans le courant GABA_B

Nous avons utilisé cette approche pour déterminer le rôle de TREK1 au niveau de l'hippocampe, structure cérébrale impliquée notamment dans la mémoire. Dans l'hippocampe, les récepteurs GABA_B postsynaptiques sont impliqués dans l'activation de courants potassiques (courant GABA_B) décrits il y a 30 ans par Newberry et Nicoll [12]. Ce courant GABA_B est à l'origine des potentiels postsynaptiques inhibiteurs lents (PPSI-lents) et il résulte du seul couplage GABA_B-GIRK (GIRK étant un canal potassique d'une autre famille) [13]. En comparant les courants ioniques obtenus lors d'impulsions lumineuses à des longueurs d'onde de 500 nm (canal TREK1 actif) et 380 nm (canal TREK1 non fonctionnel), nous avons pu établir que TREK1 est également impliqué dans le courant GABA_B. Ainsi, TREK1, jusqu'à présent considéré comme un canal de fuite, contribue activement à la réponse GABA_B hippocampique, ce qui rompt avec l'idée classique selon laquelle la réponse GABA_B hippocampique implique seulement le couplage GABA_B-GIRK [14].

Notre approche expérimentale offre donc un moyen facile et attractif pour caractériser, à l'échelon moléculaire, les canaux ioniques et les récepteurs impliqués dans des réponses biologiques variées (courant, élévation du calcium intracellulaire, etc.), et ainsi pallier l'absence d'outils pharmacologiques pour une telle étude. ♦

Optical remote control of native ion channels

LIENS D'INTÉRÊT

Les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt concernant les données publiées dans cet article.

RÉFÉRENCES

1. Lesage F, Guillemare E, Fink M, et al. TWIK-1, a ubiquitous human weakly inward rectifying K⁺ channel with a novel structure. *EMBO J* 1996 ; 15 : 1004-11.
2. Sandoz G, Douguet D, Chatelain F, et al. Extracellular acidification exerts opposite actions on TREK1 and TREK2 potassium channels via a single conserved histidine residue. *Proc Natl Acad Sci USA* 2009 ; 106 : 14628-33.
3. Sandoz G, Bell SC, Isacoff EY. Optical probing of a dynamic membrane interaction that regulates the TREK1 channel. *Proc Natl Acad Sci USA* 2011 ; 108 : 2605-10.
4. Noel J, Sandoz G, Lesage F. Molecular regulations governing TREK and TRAAK channel functions. *Channels (Austin)* 2011 ; 5 : 402-9.
5. Heurteaux C, Guy N, Laigle C, et al. TREK-1, a K⁺ channel involved in neuroprotection and general anesthesia. *EMBO J* 2004 ; 23 : 2684-95.
6. Noel J, Zimmermann K, Busserolles J, et al. The mechano-activated K⁺ channels TRAAK and TREK-1 control both warm and cold perception. *EMBO J* 2009 ; 28 : 1308-18.
7. Heurteaux C, Lucas G, Guy N, et al. Deletion of the background potassium channel TREK-1 results in a depression-resistant phenotype. *Nat Neurosci* 2006 ; 9 : 1134-41.
8. Mazella J, Petraut O, Lucas G, et al. Spadin, a sortilin-derived peptide, targeting rodent TREK-1 channels: a new concept in the antidepressant drug design. *PLoS Biol* 2010 ; 8 : e1000355.
9. Mattis J, Tye KM, Ferenczi EA, et al. Principles for applying optogenetic tools derived from direct comparative analysis of microbial opsins. *Nat Methods* 2012 ; 9 : 159-72.
10. Szobota S, Isacoff EY. Optical control of neuronal activity. *Annu Rev Biophys* 2010 ; 39 : 329-48.
11. Banghart M, Borges K, Isacoff E, et al. Light-activated ion channels for remote control of neuronal firing. *Nat Neurosci* 2004 ; 7 : 1381-6.
12. Newberry NR, Nicoll RA. Direct hyperpolarizing action of baclofen on hippocampal pyramidal cells. *Nature* 1984 ; 308 : 450-2.
13. Luscher C, Jan LY, Stoffel M, et al. G protein-coupled inwardly rectifying K⁺ channels (GIRKs) mediate postsynaptic but not presynaptic transmitter actions in hippocampal neurons. *Neuron* 1997 ; 19 : 687-95.
14. Sandoz G, Levitz J, Kramer RH, Isacoff EY. Optical control of endogenous proteins with a photoswitchable conditional subunit reveals a role for TREK1 in GABA(B) signaling. *Neuron* 2012 ; 74 : 1005-14.
15. Girard C, Lesage F. Neuronal background two-P-domain potassium channels: molecular and functional aspects. *Med Sci (Paris)* 2004 ; 20 : 544-9.

NOUVELLE

Nés pour sentir ?

Samuel Bernard

► Est-ce que de nouveaux neurones sont formés au cours de la vie dans le bulbe olfactif humain ? Non, selon une étude menée par K.L. Spalding et J. Frisén, de l'Institut Karolinska à Stockholm (Suède) [1]. Dans cette étude parue récemment dans la revue *Neuron*, Bergmann et al. [1] montrent que les neurones du bulbe olfactif humain sont aussi âgés que l'individu. Chez les mammifères rongeurs, deux régions du cerveau, l'hippocampe et le bulbe olfactif, possèdent la capacité de former de

nouveaux neurones à l'âge adulte [2, 3]. Les jeunes neurones proviennent de deux zones germinatives riches en cellules souches neuronales : la zone sous-granulaire (ZSG) du gyrus denté dans l'hippocampe et la zone sous-ventriculaire (ZSV) le long des ventricules cérébraux. La ZSV contient des cellules souches neuronales qui se différencient en neuroblastes pour ensuite migrer vers le bulbe olfactif tout au long de la vie [4]. La neurogenèse du bulbe olfactif a été démontrée chez les rongeurs et les

University of Lyon 1, CNRS UMR 5208, Institut Camille Jordan, 43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France. bernard@math.univ-lyon1.fr

primates. Cependant, chez l'humain, la migration des neurones vers le bulbe olfactif décline de façon abrupte durant la petite enfance [5, 6], et la persistance d'une neurogenèse du bulbe olfactif chez l'homme adulte n'a pas été établie.

La seule présence de neuroblastes ne suffit pas à quantifier le rythme d'intégration des neurones dans le bulbe olfactif. La différenciation des neuroblastes peut se solder par une neurogenèse transitoire et un renouvellement

Figure 1. La capacité des cellules nouvellement formées à intégrer le tissu de façon stable affecte drastiquement l'âge moyen du tissu. A. L'intégration transitoire donne un âge moyen élevé et un renouvellement lent. Par exemple, si chaque année on remplace les 2 cellules jeunes d'une population constituée de 2 cellules jeunes et de 14 cellules âgées de 10 ans, l'âge moyen sera $(2 \text{ cellules jeunes} \times 0 \text{ an} + 14 \text{ cellules âgées} \times 10 \text{ ans}) / (2 + 14 \text{ cellules}) = 8,75 \text{ ans}$. **B.** L'intégration stable donne un âge moyen réduit et un renouvellement rapide. Si chaque année, les 2 cellules les plus âgées sont remplacées (âge 8 ans) parmi un total de 16 cellules : l'âge moyen sera la moyenne des âges entre les plus jeunes (0 an) et les plus vieilles (7 ans), soit $(2 \times 0 \text{ an} + 2 \times 1 \text{ an} + 2 \times 2 \text{ ans} + \dots + 2 \times 7 \text{ ans}) / 16 = 3,5 \text{ ans}$.

faible des neurones (Figure 1A), ou une intégration stable des neurones et un renouvellement important (Figure 1B). Pour quantifier le renouvellement, il convient plutôt de caractériser l'âge de tous les neurones matures. En 2005, Spalding *et al.* [7] avaient développé une technique pour déterminer l'âge d'un tissu en exploitant la présence dans l'ADN génomique de carbone 14 (^{14}C) dérivé des essais nucléaires effectués durant la guerre froide. Les essais de surface effectués avant le traité d'interdiction partielle de 1963¹ ont causé une augmentation marquée du taux de ^{14}C atmosphérique. Depuis le traité,

¹ Le traité d'interdiction partielle d'essais nucléaires, signé à Moscou le 5 août 1963, interdit les essais à but militaire et pacifique, dans l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace. Le traité était important du point de vue de l'environnement, car il limitait les retombées radioactives étroitement associées aux essais atmosphériques, mais il eut peu d'effet sur les essais nucléaires dans leur ensemble, qui se firent largement sous terre (extrait du site des Nations-Unies).

le niveau a diminué continuellement, par diffusion du ^{14}C dans le biotope. Ce carbone entre dans la chaîne alimentaire par photosynthèse et le niveau de ^{14}C dans le corps reflète fidèlement celui de l'atmosphère. Comme l'ADN est une molécule stable dans des cellules postmitotiques après la dernière division cellulaire, on peut déterminer l'âge d'une population de cellules d'un sujet en comparant les niveaux de ^{14}C dans l'ADN et dans l'atmosphère depuis la naissance du sujet.

Nous avons tiré parti de la mesure du ^{14}C cellulaire pour dater l'âge des neurones du bulbe olfactif chez l'humain [1]. Dans un tissu à renouvellement rapide, dans lequel toutes les cellules sont jeunes, le niveau de ^{14}C mesuré est similaire à celui de l'atmosphère à la date de collection du tissu. En revanche, si les cellules sont presque aussi vieilles que le sujet, le niveau de ^{14}C mesuré

sera similaire à celui de l'atmosphère à la date de la naissance du sujet (Figure 2A). On parle d'un tissu à renouvellement lent.

Nous avons mesuré les niveaux de ^{14}C dans l'ADN génomique de neurones et de cellules non neuronales du bulbe olfactif, chez plusieurs individus post-mortem. Le niveau de ^{14}C des neurones isolés du bulbe olfactif est identique au niveau de ^{14}C mesuré dans l'atmosphère au moment de la naissance de l'individu, ce qui suggère que, s'il existe, le renouvellement est très lent. À l'opposé, le niveau de ^{14}C dans les cellules non neuronales du bulbe olfactif est différent du niveau atmosphérique à la naissance, indiquant un renouvellement cellulaire. La comparaison des niveaux de ^{14}C ne permet pas de quantifier directement les taux de renouvellement. Le niveau de ^{14}C mesuré est une moyenne des niveaux d'une population cellulaire, incluant probablement des cellules d'âge différent, et elle reflète la démographie du tissu. Pour explorer les différents scénarios d'évolution démographique dans le bulbe olfactif, nous avons utilisé un ensemble de modèles mathématiques de populations cellulaires décrivant la naissance, le vieillissement et la disparition des cellules [1, 8, 9].

Dans le scénario le plus simple, le tissu est formé durant le développement et est renouvelé à un taux constant après la naissance. Le seul paramètre caractérisant ce modèle, le taux de renouvellement, correspond à la fraction de cellules mortes et remplacées chaque année. Comme le renouvellement est ininterrompu à partir de la naissance, il faut calculer la moyenne entre les niveaux de ^{14}C des cellules survivant depuis la naissance et des nouvelles cellules accumulées à chaque année de vie (Figure 2B). Le résultat est le niveau moyen de ^{14}C dans une population contenant des jeunes et des vieilles cellules. En ajustant le modèle aux cellules non neuronales, on trouve un taux de renouvellement de 2,0 à

Figure 2. Étapes de datation d'un échantillon sur la courbe de ^{14}C atmosphérique (courbe bleue). **A.** Pour un sujet né en 1969 (ligne pointillée verticale), le niveau de ^{14}C , exprimé en fraction carbone moderne (1), est rapporté sur la courbe de carbone atmosphérique (2). L'année correspondant à ce niveau est 1979 (3). Pour un sujet né avant 1963 (ligne pleine verticale), le niveau de carbone ne peut pas être rapporté sur la courbe de façon unique, mais un niveau plus élevé que le niveau atmosphérique indique un renouvellement cellulaire (a). **B.** Exemple de datation avec renouvellement constant et une moyenne des niveaux de ^{14}C (courbe bleue, axe de gauche) pondérée par la fraction (densité) du nombre de cellules nées chaque année (courbe rouge, axe de droite). Pour un sujet né en 1969, avec un renouvellement de 5 % par an et échantillonné en 2004, le niveau moyen de ^{14}C dans l'ADN sera de 1,24, correspondant au niveau atmosphérique en 1982 (1). Le modèle de renouvellement constant donne une information plus précise : l'âge moyen des cellules est de 16,5 ans, pour une date de naissance moyenne de 1988 (2).

3,4 % par an. Ce taux de renouvellement représente une moyenne, qui peut varier entre les différents types de cellules non neuronales. Quand le scénario de renouvellement constant est appliqué aux neurones, le taux de renouvellement obtenu est minuscule, de l'ordre de $0,008 \% \pm 0,08 \%$ par an. Cela correspond à moins de 1 % de nouveaux neurones sur toute une vie ! Sachant que le taux de renouvellement pourrait atteindre 50 % par an chez les rongeurs [3], la différence est énorme. La variabilité du taux de renouvellement est grande (écart-type de $0,08 \%$ par an), et il se peut que la neurogenèse soit plus importante chez certains sujets. Quand le scénario de renouvellement constant est ajusté pour chaque sujet individuellement, le résultat est le même : la neurogenèse est au mieux transitoire. Il se peut aussi que la neurogenèse varie avec l'âge du sujet. D'autres scénarios décrivant des évolutions temporelles plus complexes, comme un déclin de la neurogenèse à l'âge adulte, ont été testés et donnent

des résultats similaires. Même si de nouveaux neurones sont produits chez l'humain, ils ne s'intègrent pas durablement dans le bulbe olfactif. Ces résultats sont cohérents avec les études récentes indiquant une faible migration de neurones vers le bulbe olfactif passé la petite enfance [5, 6].

Chez les rongeurs, les neurones nouveaux-nés du bulbe olfactif intègrent les réseaux synaptiques et participent à des fonctions complexes comme la mémoire olfactive, la discrimination d'odeur et les interactions sociales [10]. L'absence d'une telle neurogenèse chez l'humain soulève une question : ces fonctions sont-elles régulées par des mécanismes conceptuellement différents ? ou le rôle limité de l'olfaction chez l'humain est-il causé par le manque de plasticité du bulbe olfactif ? Les sommeliers et autres « nez » pourront peut-être apporter une partie de la solution... ♦

Born to smell

LIENS D'INTÉRÊT

L'auteur déclare n'avoir aucun lien d'intérêt concernant les données publiées dans cet article.

RÉFÉRENCES

1. Bergmann O, Liebl J, Bernard S, et al. The age of olfactory bulb neurons in humans. *Neuron* 2012 ; 74 : 634-9.
2. Kornack DR, Rakic P. The generation, migration, and differentiation of olfactory neurons in the adult primate brain. *Proc Natl Acad Sci USA* 2001 ; 98 : 4752-7.
3. Imayoshi I, Sakamoto M, Ohtsuka T, et al. Roles of continuous neurogenesis in the structural and functional integrity of the adult forebrain. *Nat Neurosci* 2008 ; 11 : 1153-61.
4. De Chevigny A, Lledo PM. La neurogenèse bulbaire et son impact neurologique. *Med Sci (Paris)* 2006 ; 22 : 607-13.
5. Sanaï N, Nguyen T, Ihrie RA, et al. Corridors of migrating neurons in the human brain and their decline during infancy. *Nature* 2011 ; 478 : 382-6.
6. Wang C, Liu F, Liu YY, et al. Identification and characterization of neuroblasts in the subventricular zone and rostral migratory stream of the adult human brain. *Cell Res* 2011 ; 21 : 1534-50.
7. Spalding KL, Bhardwaj RD, Buchholz BA, et al. Retrospective birth dating of cells in humans. *Cell* 2005 ; 122 : 133-43.
8. Bergmann O, Bhardwaj RD, Bernard S, et al. Evidence for cardiomyocyte renewal in humans. *Science* 2009 ; 324 : 98-102.
9. Bernard S, Frisén J, Spalding KL. A mathematical model for the interpretation of nuclear bomb test derived incorporation in biological systems. *Nucl Instrum Methods Phys Res B* 2010 ; 268 : 1295-8.
10. Lazarini F, Lledo PM. Is adult neurogenesis essential for olfaction? *Trends Neurosci* 2011 ; 34 : 20-30.