contredisent plusieurs études antérieures suggérant que l'excitotoxicité implique les récepteurs NMDA extrasynaptiques dans des préparations de neurones en culture [7]. Cependant, ils sont en parfait accord avec d'autres travaux, similaires aux nôtres, qui démontrent que dégrader la D-sérine dans des tranches de cerveaux procure un effet neuroprotecteur [9]. Ainsi, il semble que le phénomène d'excitotoxicité soit régulé par des mécanismes différents dans des préparations de neurones en culture et dans des tranches de cerveaux de rongeurs adultes, deux modèles dans lesquels la distribution de la D-sérine et de la glycine et les fonctions jouées par les récepteurs NMDA synaptiques et extrasynaptiques ne sont probablement pas les mêmes.

Conclusion

En résumé, nos résultats révèlent deux aspects novateurs de l'activité des récepteurs NMDA. Le premier concerne leur mode opératoire : le coagoniste

endogène qui gouverne leur activité diffère selon la localisation cellulaire des récepteurs, de sorte que deux populations fonctionnellement distinctes semblent exister : les récepteurs synaptiques, contrôlés par la D-sérine, et les récepteurs extrasynaptiques, contrôlés par la glycine. Le second aspect concerne le rôle de ces deux populations de récepteurs dans la plasticité synaptique et l'excitotoxicité. Alors que les récepteurs synaptiques sont suffisants et nécessaires pour induire l'excitotoxicité et la LTP, la LTD, en revanche, requiert l'activation conjointe des deux populations de récepteurs. En outre, nos travaux remettent en question la proposition de considérer les récepteurs extrasynaptiques comme une cible thérapeutique dans les maladies neurodégénératives. Ils ouvrent en revanche de nouvelles perspectives quant aux rôles des récepteurs synaptiques et leur régulation par la D-sérine d'origine gliale dans ces pathologies. ♦

Importance of the location of NMDA glutamate receptors

LIENS D'INTÉRÊT

Les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt concernant les données publiées dans cet article.

RÉFÉRENCES

1. Malenka RC, Bear MF. LTP and LTD: an embarrassment of riches. *Neuron* 2004 ; 44 : 5-21.
2. Johnson JW, Ascher P. Glycine potentiates the NMDA response in cultured mouse brain neurons. *Nature* 1987 ; 325 : 529-31.
3. Mothet JP, Parent AT, Wolosker H, et al. D-serine is an endogenous ligand for the glycine site of the N-methyl-D-aspartate receptor. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000 ; 97 : 4926-31.
4. Mothet JP, Pollegioni L, Ouanounou G, et al. Glutamate receptor activation triggers a calcium-dependent and SNARE protein-dependent release of the gliotransmitter D-serine. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005 ; 102 : 5606-11.
5. Panatier A, Theodosis DT, Mothet JP, et al. Glia-derived D-serine controls NMDA receptor activity and synaptic memory. *Cell* 2006 ; 125 : 775-84.
6. Henneberger C, Papouin T, Oliet SH, Rusakov DA. Long-term potentiation depends on release of D-serine from astrocytes. *Nature* 2010 ; 463 : 232-6.
7. Hardingham GE, Bading H. Synaptic versus extrasynaptic NMDA receptor signalling: implications for neurodegenerative disorders. *Nat Rev Neurosci* 2010 ; 11 : 682-96.
8. Papouin T, Ladépêche L, Ruel J, et al. Synaptic and extrasynaptic NMDA receptors are gated by different endogenous coagonists. *Cell* 2012 ; 150 : 633-46.
9. Katsuki H, Nonaka M, Shirakawa H, et al. Endogenous D-serine is involved in induction of neuronal death by N-methyl-D-aspartate and simulated ischemia in rat cerebrocortical slices. *J Pharmacol Exp Ther* 2004 ; 311 : 836-44.

NOUVELLE

Production d'un pancréas fonctionnel *in vivo* par complémentation de blastocyste

Preuve de concept chez le porc

Laure Coulombel

médecine/sciences, ADR Inserm Paris V, 2, rue d'Alésia, 75014 Paris, France.

laure.coulombel@inserm.fr

► Nous avons relaté il y a quelques mois dans une Nouvelle les résultats de la complémentation de blastocystes de souris *pdx1*^{-/-} (un gène clé de la spécification du pancréas) par des iPS (*induced pluripotent stem cells*) de rat. Après leur transfert dans un utérus de souris, certains de ces embryons chimères interspèces ont abouti à la naissance de souris dont

le pancréas, tout à fait fonctionnel, était entièrement dérivé des iPS de rat [1]. Il y avait donc deux résultats : la création d'une chimère interspèce (souris/rat), et la restauration d'un organe complet, le pancréas, chez l'espèce qui en était dépourvue. Il était clair que l'équipe de H. Nakauchi ne s'arrêterait pas là. La seconde étape, l'application de cette

démarche à un gros animal, le porc, vient d'être publiée dans *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* [2].

Acte 1. Créer des fœtus de porcs sans pancréas

Le développement du pancréas a été bloqué *in vivo* chez les porcs par la surexpression d'un transgène, *Hes1* (*hairy*

Figure 1. Démarche expérimentale. **A.** Dérivation de porcs dépourvus de pancréas par insertion du transgène *Pdx1-hes1* surexprimant *Hes1* dans le pancréas (sous contrôle du promoteur *Pdx1*), et obtention d'embryons *Pdx1-hes1* par transfert nucléaire. **B.** Obtention d'embryons exprimant le transgène codant pour l'étiquette fluorescente orange (Kusabira-Orange). **C.** Complémentation des blastocystes *Pdx1-Hes1* par des blastomères provenant d'embryons transgéniques pour l'étiquette Kusabira-Orange, et transfert des embryons chimères dans un utérus de truie. Des porcs chimériques normaux, porteurs d'un pancréas provenant exclusivement des blastomères « orange » ont été obtenus. Ils ont été croisés avec des femelles normales ; les gamètes mâles étant exclusivement d'origine hôte, non chimériques, la descendance était dépourvue de pancréas.

enhancer of split), un gène cible de la voie Notch dont on connaît le rôle inhibiteur sur la différenciation du pancréas endocrine. Ces porcs transgéniques ont été obtenus par l'injection, dans le cytoplasme d'ovocytes (par ICSI, *intracytoplasmic sperm injection*), de spermatozoïdes ayant incorporé la construction *Pdx1-Hes1*, dans laquelle l'expression du gène *Hes1* est sous le contrôle du promoteur du gène *Pdx1*, indispensable à l'acquisition de l'identité du pancréas (Figure 1A). Onze fœtus furent obtenus

sur 1 282 embryons obtenus par ICSI et transférés, dont deux n'avaient qu'une minuscule ébauche de pancréas (5 % du volume de l'organe normal). Des fibroblastes ont été prélevés sur le fœtus mâle sans pancréas, et amplifiés *in vitro*. Les noyaux de ces fibroblastes, transférés dans des ovocytes énucléés, ont permis de « cloner » des embryons qui, une fois transférés dans l'utérus, se développent en fœtus également dépourvus de pancréas (9 fœtus sur 229 embryons clonés).

Acte 2. Correction du déficit pancréatique par complémentation de blastocyste.

Une fois cette étape d'obtention de porcs a-pancréatiques validée, des blastocystes *Pdx1-Hes1* mâles « clonés » par transfert nucléaire ont été « complétés » par l'injection d'une dizaine de blastomères issus d'embryons (morula) porteurs d'un gène *Pdx1* normal et transgéniques pour un ADNc codant pour une étiquette fluorescente orange (Figure 1C).

Ces embryons ont été dérivés également par transfert de noyaux de fibroblastes de femelles transgéniques dans des ovocytes (*Figure 1B*). Parmi les 96 embryons chimériques « complémentés » transférés dans l'utérus de truies, 14 se développèrent jusqu'au terme (110 jours). Cinq de ces fœtus étaient mâles et chimériques (les 9 autres n'étaient pas chimériques, ils étaient soit mâles et dépourvus de pancréas, soit femelles, issus des blastomères normaux). Dans les cinq chimères analysées, le pancréas était normal, anatomiquement et histologiquement, et toutes les cellules émettaient une fluorescence orange, indiquant qu'il s'était développé à partir des blastomères femelles. Les autres tissus étaient composites, avec 40 à 60 % de cellules fluorescentes orange XX, indiquant un chimérisme homogène. La procédure de complémententation fut répétée avec d'autres cellules « complémentantes » normales, facilement reconnaissables, et cinq porcelets vivants obtenus sur 19 embryons transférés. Tous les cinq étaient des mâles ; au cours des 12 mois de suivi, tous se développèrent normalement sans qu'aucune anomalie du métabolisme du glucose ne soit constatée. Un d'entre eux fut sacrifié à un an pour analyser le pancréas, qui s'avéra tout à fait normal et composé presque exclusivement de cellules issues des cellules « complémentantes » normales. Les quatre porcelets restants étaient fertiles, mais leur descendance (après croisement avec des femelles normales) était dépourvue de pancréas : ceci indique que les gamètes mâles des porcelets étaient exclusivement d'origine hôte (et porteurs du transgène *Pdx1-Hes1*). Ce n'était pas une surprise, car cette incapacité de cellules femelles XX à participer à la production de gamètes mâles dans les chimères a déjà été décrite chez le porc comme chez la souris.

Acte 3. What next ?

Les auteurs confirment donc que la « fabrication » d'un organe entier fonctionnel est possible chez un gros animal *via* une procédure de complémententation de blastocystes dont ils avaient fait la preuve de concept chez le rongeur précédemment [1, 2]. Les auteurs ont évidemment en tête un autre « gros animal », l'homme, et la complémententation des embryons *Pdx-Hes1* porcins par des cellules souches pluripotentes humaines, iPS en priorité. Mais ils ne sous-estiment pas les obstacles qu'ils devront franchir : la première est inhérente aux cellules pluripotentes : celles des primates ou de l'homme sont plus matures que celles des rongeurs, et, si l'on se réfère aux essais de création de chimères récemment publiés chez le singe [4] et rapportés dans *médecine/sciences* [5], sont spontanément probablement limitées dans ce potentiel de contribuer à des chimères post-natales. La seconde difficulté est la barrière d'espèce, et l'efficacité de la complémententation de blastocystes de porcs par des iPS de singe, de vache (nul doute que ces essais soient en cours) ou humaines est loin d'être acquise. Au-delà, et si ces difficultés trouvent des solutions, on se heurtera à plusieurs problèmes éthiques, dont celui d'un éventuel développement de gamètes humains dans de telles chimères. Il est vrai que la configuration utilisée ici ne le permet probablement pas, puisque plusieurs études ont démontré que des cellules XX « complémentantes » ne se développent pas en gamètes mâles dans des blastocystes mâles. On peut aussi imaginer bloquer le développement de ces gamètes, soit selon une stratégie proche de celle utilisée ici pour bloquer le développement du pancréas, ou *via* une stratégie de gène suicide, déjà envisagée pour éliminer des dérivés tissulaires d'iPS qui se comporteraient de façon aberrante après leur transplantation.

En ces temps de crise, les Japonais prédisent même que cette approche de création d'organes pourrait être moins coûteuse que certaines approches médicales actuelles : l'obtention de sperme de porcs *Pdx-Hes1* est possible en grande quantité et le clonage d'embryons transgéniques semble presque routinier. Quant à la greffe d'îlots pancréatiques, elle sera faite en conditions « autologues », donc sans immunosuppression, geste bien codifié et sans danger. En somme il n'y a plus qu'à... Optimisme exagéré ou réalisme, toujours est-il qu'on peut s'étonner, et peut-être s'inquiéter, de l'absence de débat en France sur les questions que soulèvent ces stratégies... ♦

Blastocyst complementation in pigs allows development of a functional pancreas *in vivo*

LIENS D'INTÉRÊT

L'auteur déclare n'avoir aucun lien d'intérêt concernant les données publiées dans cet article.

RÉFÉRENCES

1. Coulombel L. Une souris peut-elle fabriquer un pancréas d'éléphant ? *Med Sci (Paris)* 2010 ; 26 : 914-6.
2. Kobayashi T, Yamaguchi T, Hamanaka S, et al. Generation of rat pancreas in mouse by interspecific blastocyst injection of pluripotent stem cells. *Cell* 2010 ; 142 : 787-99.
3. Matsunari H, Nagashima H, Watanabe M, et al. Blastocyst complementation generates exogenous pancreas *in vivo* in pancreatic cloned pigs. *Proc Natl Acad Sci USA* 2013 : early edition.
4. Tachibana M, Sparman M, Ramsey C, et al. Generation of chimeric Rhesus monkeys. *Cell* 2012 ; 148 : 1-11.
5. Coulombel L. Contribution de cellules ES au chimérisme post-natal : échec chez le singe. *Med Sci (Paris)* 2012 ; 28 : 370-2.

**Abonnez-vous
à médecine/sciences**

**Bulletin d'abonnement
page 330 dans ce numéro de m/s**