► L'épissage des ARN pré-messagers est une étape obligatoire pour l'assemblage de la très grande majorité des ARN messagers chez les organismes eucaryotes. Chez l'homme, chacun des gènes donne naissance à au moins deux transcrits, avec une moyenne de 6 à 8 transcrits par gène. C'est l'établissement d'une continuité entre les exons consécutifs qui permet la lecture de la séquence servant de matrice à la machinerie de synthèse protéique. Néanmoins, l'épissage n'est pas univoque. Il admet des variantes, ou épissages alternatifs (EA), qui concourent à accroître la variabilité protéique, comblant ainsi en partie l'écart existant entre le nombre de gènes – 20 000 à 25 000 chez l'homme – et le nombre minimal de protéines synthétisées – au moins 100 000. En outre, bien que les EA relèvent souvent de besoins cellulaires spécifiques, un ensemble d'événements aberrants peut survenir et participer au développement de maladies génétiques ou de pathologies acquises comme les maladies neuro-dégénératives ou les cancers. Dans ces situations, les événements d'EA peuvent servir de marqueurs de ces états, voire de cibles potentielles pour des approches thérapeutiques visant à corriger les défauts. Dans cette Synthèse, nous allons rappeler les principaux mécanismes de régulation de l'épissage et de l'EA. Nous présenterons notamment le splicéosome, un macro-complexe ribonucléoprotéique constituant le cœur de la machinerie d'épissage, récemment identifié comme une cible privilégiée de mutations dans plusieurs pathologies. Nous discuterons de certains des défauts du splicéosome associés à des altérations survenant en *cis* (sur l'ADN, et donc sur l'ARN pré-messager) et en *trans* (dans des protéines interagissant avec l'ARN pré-messager), telles qu'elles ont été rapportées dans des maladies génétiques ou acquises. ◀

L'épissage des ARN pré-messagers : quand le splicéosome perd pied

Gwendal Dujardin^{1,*}, Élisabeth Daguenet^{1,*},
Delphine G. Bernard², Marion Flodrops²,
Stéphanie Durand², Aurélie Chauveau^{2,3},
Flaria El Khoury², Catherine Le Jossic-Corcos²,
Laurent Corcos²

¹Centre de Regulació Genòmica (CRG), the Barcelona Institute of Science and Technology, Barcelone, Espagne ;

²Inserm U1078-ECLA, Université de Bretagne Occidentale, Institut Brestois en Santé Agro Matière (IBSAM), Faculté de médecine, 22, avenue Camille Desmoulins, 29200 Brest, France ;

³Centre Hospitalier Universitaire de Brest, Boulevard Tanguy Prigent, 29200 Brest, France.

*Ces deux auteurs ont eu une contribution égale dans la préparation de ce manuscrit.
laurent.corcos@inserm.fr

L'épissage des ARN pré-messagers

Le cycle du splicéosome

L'épissage des ARN pré-messagers prend place dans le noyau cellulaire. Il est assuré par un complexe de plus de 200 protéines associées ou non à des petites ribonucléoprotéines, les snRNP (*small nuclear ribonucleoprotein*) U1, U2, U4/U6 et U5 [1]. Le macro-complexe ainsi formé, le splicéosome, assure l'excision des introns et la ligature des exons, en un cycle bien caractérisé faisant intervenir deux réactions consécutives de *trans*-estérification (Figure 1A). L'architecture du splicéosome et l'intervention séquentielle des différents complexes ont été déterminées par un ensemble de travaux faisant appel à des méthodes de biochimie analytique et structurale [2]. Dans une première étape, les séquences cibles de l'ARN sont reconnues par les snRNP U1 et U2, formant le complexe A. Ensuite, le recrutement de la tri-snRNP U4/U6.U5 permet la formation du complexe B qui, à la suite de nombreuses modifications à la fois structurales et conformationnelles, devient le complexe B^{act} (présentant une activité catalytique) au sein duquel a lieu la première étape de la réaction d'épissage et la formation du complexe C. La seconde étape de *trans*-estérification est alors réalisée, les exons mis bout à bout, l'intron dégradé et les snRNP sont recyclées. Une famille d'hélicases à ARN dépendantes de l'ATP est impliquée dans les transitions entre chaque étape du cycle,

Figure 1. La machinerie d'épissage. A. Le cycle du spliceosome. Le spliceosome réalise la réaction d'épissage en recrutant séquentiellement plusieurs sous-unités ribonucléoprotéiques lors de deux réactions de trans-estérification successives à la suite desquelles le segment intronique (lasso) est éliminé et les deux exons successifs sont associés dans l'ARNm. **B. Organisation d'une unité d'épissage.** Plusieurs déterminants de séquence sont reconnus par la machinerie d'épissage. Il s'agit des sites donneurs et accepteurs en 5' et en 3' des introns, respectivement, du site de polypyrimidines (Y)n vers l'extrémité 3' de l'intron et du point de branchement (PB). Plusieurs types de séquences activatrices (ESE, ISE) ou inhibitrices (ESS, ISS) participent également à la reconnaissance de l'exon en interagissant avec des protéines riches en sérines et en arginines (SR) ou avec des protéines hnRNP (*heterogenous nuclear ribonucleoproteins*). Les sites d'interaction de complexes du spliceosome U1 snRNP (*small nuclear ribonucleoprotein*) et U2 snRNP sont indiqués. ISE : *intronic splice enhancer*; ESE : *exonic splice enhancer*; ISS : *intronic splice silencer*; ESS : *exonic splice silencer*.

permettant un remodelage des complexes indispensable à la réaction d'épissage [3, 50] (→). Il est important de mentionner que le spliceosome existe sous deux formes partiellement superposables, le spliceosome « majeur » (voir plus haut), dont dépend la majorité des introns, et le spliceosome « mineur » qui prend en charge moins de 1 % des introns humains et utilise les snRNP U11, U12, U4atac, U5 et U6atac [4]. Les introns reconnus par le spliceosome mineur présentent des sites AT (site 5') et AC (site 3'), ou des sites consensus reconnus par le spliceosome majeur, GT (en 5') et AG (en 3'). Ces introns reconnus par le spliceosome mineur sont enrichis au sein des gènes impliqués dans la réplication et la réparation de l'ADN, dans la transcription, l'épissage et la synthèse protéique, mais

sont absents des gènes du métabolisme énergétique et des voies de biosynthèse.

Organisation d'une unité d'épissage

Plusieurs déterminants de séquence, présents dans les introns, permettent à la machinerie de « définir » les exons. Il s'agit des sites 5', ou sites donneurs d'épissage, des sites 3', ou sites accepteurs d'épissage, du site de branchement vers l'extrémité 3' de l'intron, et d'une étendue de pyrimidines située entre le site de branchement et le site 3' (Figure 1B). Les séquences consensus retrouvées au niveau des sites d'épissage sont suffisamment robustes pour que différents algorithmes informatiques puissent déterminer les jonctions introns-exons et donc prédire leur utilisation probable par le spliceosome. Néanmoins, ces séquences ne possèdent pas toutes la même capacité à attirer la machinerie d'épissage et, lorsque certaines d'entre elles ne sont pas reconnues par le spliceosome, l'épissage devient alternatif.

L'épissage alternatif

L'activité d'épissage peut être influencée par des protéines agissant via différents sites, présents dans les exons et dans les introns, voire par interaction directe avec le spliceosome. De façon générale, ces protéines se répartissent en deux familles principales, les protéines SR (riches en sérines et arginines) et les hnRNP (*heterogenous nuclear ribonucleoproteins*) qui respectivement favorisent ou réfrènt l'inclusion normale des exons [5]. Cette « règle », dérivée de l'observation, admet pourtant des exceptions, de sorte que les rôles positifs ou négatifs peuvent revenir respectivement aux hnRNP et aux protéines SR, en particulier selon l'environnement nucléotidique. Ces protéines peuvent lier des séquences introniques ou exoniques activatrices (les ISE [*intronic splice enhancer*] et les ESE [*exonic splice enhancer*]) ou inhibitrices (les ISS [*intronic splice silencer*] et les ESS [*exonic splice silencer*]), stimulant ou réduisant par là-même, la capacité des complexes du spliceosome à catalyser la réaction d'épissage, vraisemblablement par une interaction directe avec certains des composants du système (Figure 1B). Certains membres d'une même famille peuvent parfois présenter des spécificités d'expression tissulaire marquées comme, par exemple, les protéines NOVA enrichies au niveau du cerveau [6]. De fait, les prédictions informatiques de la position des sites d'activité des protéines SR et hnRNP sont sensiblement moins performantes que celles des sites consensus évoqués plus haut. Plusieurs types d'épissage alternatif ont été caractérisés, dont l'événement majoritaire est l'exclusion d'un

(→) Voir également la Synthèse de P. De la Grange, page 1111 de ce numéro

exon (dit exon cassette). Des exclusions mutuelles d'exons cassettes, la rétention de segments introniques ou l'activation de sites cryptiques dont la séquence et/ou l'environnement (→ Voir la Synthèse de L. Corcos et L. Solier, *m/s* n° 3, mars 2005, page 253) ne sont normalement pas reconnus par la machinerie d'épissage, ont également été identifiés (Figure 2) [7] (→).

Les altérations de l'épissage des ARN : quand le spliceosome perd pied

Différents types d'altérations, touchant les séquences d'ADN (altérations en *cis*, Figure 3A) ou les protéines d'épissage (altérations en *trans*, Figure 3B), peuvent conduire à des transitions entre les formes épissées, et donc à un épissage alternatif aberrant.

Du fait de la nécessité, pour la réaction d'épissage, de déterminants de séquence spécifiques, en particulier ceux relevant d'un consensus quasi-exclusif (par exemple les sites 5' et 3'), toute mutation affectant ces sites sera très probablement à l'origine d'un événement d'épissage alternatif. D'autres types de séquences, comme les ESE, ESS, ISE, ISS avérés, ou des polymorphismes sans fonction décrite contribuent à la variabilité des événements d'épissage (Figure 3A).

Une mutation dans un gène codant une protéine ayant un rôle fondamental dans la réaction d'épissage, ou dans la biogenèse du spliceosome, peut également induire une dérégulation de l'épissage, globale ou spécifique (Figure 3B). Ce dernier point est d'ailleurs le plus intrigant : comment une variation d'un facteur clé du spliceosome n'induit-elle pas nécessairement une dérégulation globale, mais affecte-t-elle seulement un nombre réduit de transcrits ou est spécifique d'un tissu donné ? Nous allons, dans la suite, décrire les effets de quelques mutations, en distinguant mutations germinales et mutations somatiques.

Mutations germinales

Selon la base de données « Human Gene Mutation Database » (HMGD), les mutations altérant en *cis* les sites d'épissage représenteraient jusqu'à 30 % des mutations héritées [8].

Un cas emblématique de ce type d'altérations est celui des mutations du gène *CFTR* (*cystic fibrosis transmembrane conductance regulator*), qui sont à l'origine de la mucoviscidose. Deux cent vingt-huit mutations en *cis* affectent l'épissage du gène *CFTR*, soit 11,36 % de l'ensemble des 2 007 mutations de ce gène (selon la base de données *cystic fibrosis mutation database*). Ces mutations ont des effets phénotypiques variables (d'une atteinte majeure – poumons et système digestif – à une atteinte de sévérité très modérée, comme la seule agénésie¹ des canaux déférents) selon le type d'allèles touchés et le site [9].

Par ailleurs, plusieurs altérations en *trans* de la machinerie d'épissage ont été rapportées. Le premier exemple est illustré par le cas de l'amyotrophie spinale (SMA, *spinal muscular atrophy*), une maladie autosomique dominante caractérisée par une dégénérescence des

Figure 2. Les principaux types d'épissage alternatif. Les principaux types d'épissage alternatif sont schématisés. Un exon est ou non inclus (exon cassette), des exons sont mutuellement inclus/exclus de l'ARNm, la sélection des sites donneurs ou accepteurs d'épissage conduit à un saut d'exon en 5' ou en 3', un intron peut être retenu dans l'ARNm.

Figure 3. Mécanismes altérant l'épissage. A. Altérations en cis.

On distingue les mutations (M) affectant (1) les séquences consensus d'épissage [sites 5' (5) et 3' (3), le site de branchement (A), la région riche en pyrimidines (Y)] ou (2) les sites régulateurs introniques ou exoniques (R). **B. Altérations en trans.** Des mutations (M) peuvent toucher des protéines d'épissage (3), l'abondance des protéines d'épissage peut être altérée (4), la biogenèse de la machinerie d'épissage peut être affectée (5).

motoneurones. Cette affection est due à des mutations du gène *SMN1* (*survival motor neuron 1*) responsables d'une diminution d'abondance de la protéine SMN, impliquée dans l'assemblage des snRNP [10]. L'absence

¹ Défaut de développement au stade embryonnaire.

Figure 4. Conséquences des altérations d'épissage au niveau germlinal et au niveau somatique. **A.** Effet de la mutation du gène *SMN2* (*survival of motor neuron 2*) : amyotrophie spinale. (M) : mutation. **B.** Effet de l'altération de l'assemblage correct du spliceosome : rétinopathie pigmentaire. **C.** Mutations du proto-oncogène *MET* : activation d'un signal oncogénique. **D.** Mutations du gène *SF3B1* (*splicing factor 3b subunit 1*) : syndromes myélodysplasiques, mélanome uvéal. NMD : *nonsense mediated mRNA decay*.

de SMN résulte en une altération globale du répertoire des snRNP avec de profondes conséquences sur l'activité de la machinerie d'épissage. Il existe un gène paralogue, *SMN2*, qui ne peut cependant pas compléter le défaut du gène *SMN1* en raison d'un polymorphisme C6T dans l'exon 7 responsable du saut de l'exon et conduisant à la synthèse d'une protéine instable (Figure 4A) [11].

Le second exemple porte sur la rétinopathie pigmentaire, une maladie génétique fréquente (avec une prévalence de 1/4 000) conduisant à une cécité progressive due à de nombreuses mutations distinctes avec une ségrégation essentiellement mendélienne, autosomique ou liée à l'X, récessive ou dominante. Certaines des mutations dominantes touchent des protéines du spliceosome, comme PRPF (*pre-mRNA processing factor*) 31, PRPF8, PRPF3 et hBRR2 (une hélicase essentielle pour l'épissage des pré-ARNm) en particulier (Figure 4B) [12]. Ces protéines sont impli-

quées dans l'assemblage ou le désassemblage du complexe tri-snRNP U4/U6.U5. La mutation c.2185C>T (correspondant à p.Arg729Trp sur la protéine) du gène *PRPF6* est associée à un défaut d'assemblage du complexe du fait de la localisation nucléaire aberrante de la protéine dans les corps de Cajal, des sites où prennent place des modifications et l'assemblage de plusieurs snRNP [13]. L'épissage d'un ensemble d'introns dans les gènes *MATN4* (*matrilin 4*), *CBLN1* (*cerebellin 1 precursor*) ou *AIP* (*aryl hydrocarbon receptor-interacting protein*) est altéré, comme dans le cas de mutations d'autres gènes dont *PRPF31*, *PRPF3*, et *PRPF8*, indiquant que ces manifestations rétinien- nées sont très sensibles à des altérations de la machinerie d'épissage.

Plusieurs autres pathologies affectant l'épissage en *trans* ont également été rapportées, dont une délétion du gène *SF3B4* (*splicing factor 3b subunit 4*) associée au syndrome de Nager, une affection caractérisée par des dysostoses acrofaciales² [14], ou encore la *Clericuzio-type poikiloderma*, une maladie associée à un défaut de maturation du snARN U6 [15]. En outre, plusieurs mutations affectant le fonctionnement du spliceosome mineur ont été caractérisées dont celles à l'origine d'une déficience en hormone de croissance [16] ou d'une forme de nanisme affectant le gène *MOPD 1* (*microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism*) [17], ou encore de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) [18].

Au-delà des mutations germinales, un large ensemble de mutations acquises ont été identifiées, en particulier dans les cancers.

Mutations somatiques

Les mutations de sites d'épissage survenues au niveau somatique sont relativement peu fréquentes dans les cancers [19], en comparaison des mutations germinales touchant des gènes de maladies génétiques, et d'incidence variable, plutôt faible dans le cancer du poumon [20]. Cependant, les sites d'épissage de l'exon 14 de l'oncogène *MET* sont souvent mutés dans les adénocarcinomes du poumon (3 %), conduisant à une exclusion de cet exon dans l'ARNm (*Figure 4C*) [21]. Dans les cancers, les mutations touchant des sites accessoires (ESE, ESS, etc.) seraient plus fréquentes que celles touchant des sites canoniques, à l'inverse des mutations germinales [22]. Au-delà des mutations en *cis*, les données de séquençage génomique à haut débit démontrent que les gènes codant des protéines d'épissage sont très fréquemment mutés, de sorte que chacun des 347 gènes intervenant dans les voies *RNA splicing* ou *spliceosomal complex* de la base de données *Gene Ontology* porte au minimum une mutation dans au moins un type de cancer [23], sans distribution spécifique selon les cancers. Certaines de ces mutations ont été décrites comme des mutations pilotes (*drivers*) oncogéniques. De façon remarquable, dans les syndromes myélodysplasiques (SMD), des hémopathies malignes pouvant évoluer en leucémie aiguë myéloïde (LAM), plus de la moitié des patients présentent une mutation acquise dans un gène codant une protéine d'épissage [24].

L'un des facteurs les plus fréquemment mutés est *SF3B1* (*splicing factor 3b subunit 1*), dans 20 % des syndromes myélodysplasiques (SMD), et jusqu'à 80 % dans les formes sidéroblastiques, caractérisées par la présence de sidéroblastes en couronne dans la moelle osseuse³ [25] (→).

(→) Voir la Nouvelle de F. Damm et al., m/s n° 5, mai 2012, page 449

Parmi les gènes exprimés et/ou épissés différemment lorsque *SF3B1* est muté, figurent plusieurs gènes impliqués dans la pathogenèse des SMD (*ASXL1* [*additional sex combs like 1*] et *CBL* [*casitas B-lineage lym-*

phoma]), dans l'homéostasie du fer et le métabolisme mitochondrial (*ALAS2* [*5'-aminolevulinic synthase 2*], *ABCB7* [*ATP binding cassette subfamily b member 7*] et *SLC25A37* [*mitoferrin-1*]) ou encore dans l'épissage ou la maturation des ARN (*PRPF8* [*pre-mRNA processing factor 8*] et *HNRNPD* [*heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D*]) [26]. Le gène *SF3B1* est également muté dans d'autres hémopathies myéloïdes, dans la leucémie lymphoïde chronique (10 à 15 %) [27], dans le mélanome uvéal (20 %) [28] et, à une moindre fréquence (4 %), dans les cancers du sein [29] et du pancréas [30]. De façon intrigante, seulement une fraction des événements d'épissage aberrants est commune aux différents cancers présentant une mutation de *SF3B1* [31]. *SF3B1* joue un rôle majeur dans la reconnaissance, par le spliceosome, du site 3' accepteur d'épissage, en favorisant le recrutement de la sous-unité U2 snRNP sur l'ARN pré-messager (*Figure 1B* et *Figure 4D*). Des études de séquençage d'ARN (RNAseq) menées sur différents cancers [31] montrent que les mutations fréquentes de *SF3B1* – toutes ciblées et faux sens – sont associées à la dérégulation d'un nombre restreint de jonctions d'épissage, pouvant conduire à la dégradation de certains de ces transcrits aberrants par la machinerie de contrôle qualité des ARNm (*nonsense mediated mRNA decay*). Ainsi, les mutations de *SF3B1* « tromperaient le spliceosome » en permettant, quand la séquence intronique est favorable, l'utilisation d'un site de branchement alternatif en amont, conduisant à la sélection aberrante d'un site 3' accepteur d'épissage cryptique (*Figure 4D*) [31]. Le nombre de transcrits variants reste cependant limité, car seuls les introns qui présentent certains déterminants de séquence semblent être les cibles de la forme altérée de *SF3B1*. L'impact fonctionnel de ces mutations dans le processus oncogénique nécessite encore d'être déterminé.

D'autres gènes de protéines d'épissage, ou de sa régulation, sont également affectés, notamment, dans les syndromes myélodysplasiques, les gènes *U2AF1* (*U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1*), *ZRSF2* (*U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor 35 kDa subunit-related protein 2*) et *SRSF2* (*serine/arginine-rich splicing factor 2*) [32]. Les mutations dans certains de ces gènes, dont *SF3B1* ou *U2AF1*, semblent jouer un rôle essentiel dans les étapes précoces de la maladie dans le cas, respectivement, de pathologies leucémiques ou d'adénocarcinomes du poumon [27, 33].

Plus largement, une analyse par *fusion gene microarray* menée sur 548 gènes de fusion – qui résultent de la fusion de gènes après translocations chromosomiques, les plus communes des altérations somatiques dans les cancers [19], a identifié plusieurs gènes de protéines d'épissage, dont *DDX5* (*DEAD-box helicase 5*),

² Les dysostoses acrofaciales sont un groupe de syndromes associant des anomalies de développement des extrémités, de la face et de la mâchoire.

³ Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sidéroblastiques se différencient des autres SMD par la présence, dans la moelle osseuse, de plus de 15 % de sidéroblastes en couronne dans la lignée érythroïde, par une absence de dysplasie dans les autres lignées cellulaires et par un faible pourcentage de blastes myéloïdes (< 5 %). La présence de sidéroblastes en couronne dans la moelle osseuse est due à une accumulation pathologique de fer dans les mitochondries.

FUS (*fused in sarcoma*), *hnRNP A2/B1* (*heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1*), *NONO* (*non-POU domain-containing octamer-binding protein*) et *SFPQ* (*splicing factor proline/glutamine-rich*), suggérant l'existence d'altérations fonctionnelles dans les protéines correspondantes [34]. De plus, une étude récente a permis de mettre en évidence une surreprésentation (x 1,5) de mutations somatiques synonymes dans un ensemble de 16 oncogènes (parmi lesquels *PDGFRA* [*platelet derived growth factor receptor alpha*], *EGFR* [*epidermal growth factor receptor*], *VEGFR2* [*vascular endothelial growth factor receptor 2*], *NTRK1* [*neurotrophic receptor tyrosine kinase 1*], *IL7R* [*interleukin 7 receptor*], *TSHR* [*thyroid stimulating hormone receptor*], *ELN* [*elastin*], *JAK3* [*janus kinase 3*], *ITK* [*IL2 inducible T-cell kinase*], *GATA1* [*GATA binding protein 1*], *RUNX1T1* [*Runt-related transcription factor 1-translocation partner 1*], *ALK* [*anaplastic lymphoma kinase*] et *NOTCH2* [*neurogenic locus notch homolog protein 2*]), mais pas dans les gènes suppresseurs de tumeurs. La conséquence de ces mutations est une propension à augmenter les ESE et à diminuer les ESS [22]. Ceci est à rapprocher du fait que dans cet ensemble de gènes, les exons qui contiennent le plus de mutations synonymes ont également des sites d'épissage plus « faibles » que les autres exons. Une surreprésentation en ESE résultant de mutations doit donc conduire à une augmentation du taux d'inclusion de ces exons « faibles ». Néanmoins, il serait important de savoir si les mutations synonymes dans ces oncogènes présentent une spécificité vis-à-vis du type de cancer.

Par ailleurs, un ensemble d'altérations de la machinerie d'épissage, survenu au niveau somatique, a été identifié dans les maladies neuro-dégénératives, notamment les maladies d'Alzheimer et de Parkinson [35, 36].

L'épissage alternatif : une source de nouveaux marqueurs de la progression tumorale

Les altérations de l'épissage dans le cancer sont fréquentes [37]. Globalement, le nombre d'altérations d'épissage alternatif ne permet pas de distinguer spécifiquement les cancers solides entre eux, suggérant que ces modifications sont caractéristiques de l'état cancéreux. Toutes les grandes fonctions altérées dans le cancer sont le siège d'événements d'épissage alternatif [38], parmi lesquelles l'apoptose (gènes de caspases et de protéines de la famille de *Bcl2* [*B-cell lymphoma 2*] [39], l'angiogenèse (*VEGFA* [*vascular endothelial growth factor A*] [40] et le pouvoir métastatique (*CD44*) [41]. En plus d'identifier des différences d'épissage alternatif entre tissus sains et tissus cancéreux, les analyses par séquençage d'ARN ont également permis de distinguer des sous-types de cancers du sein [42]. Une plus grande variabilité des produits d'épissage caractérise les cancers, alors que les profils d'épissage sont plus conservés dans les tissus sains [43]. Certains transcrits alternatifs sont de bons bio-marqueurs, parmi lesquels *CD44*, dont certains variants sont de pronostic favorable dans les cancers du côlon et du rectum [44]. Dans ces gènes, il est fréquent que les altérations d'épissage surviennent en dehors de mutations mais soient associées à des modifications d'activité des protéines d'épissage (voir plus haut). Il ne semble pas exister de profil de dérégulation d'épissage commun à

tous les types de cancer, en dépit du fait que quelques gènes codant des protéines d'épissage susceptibles de contribuer à ces altérations soient communément affectés, comme *SNRNPB* (*small nuclear ribonucleoprotein B*) et *DDX39A* (*DEAD-box helicase 39A*), qui sont induits, ou *CELF2* (*CUGBP, elav-like family member 2*) et *SF1* (*splicing factor 1*), qui sont réprimés. Il n'est pour autant pas aisé de savoir si ces dérégulations participent, collectivement ou individuellement, aux premières étapes du développement cancéreux, ou si elles surviennent lors des étapes de promotion tumorale.

Abords thérapeutiques

Du fait du rôle central joué par l'épissage dans l'expression phénotypique, et des conséquences de ses altérations, l'épissage est une cible intéressante pour mettre en œuvre des stratégies correctives à visée thérapeutique. De très nombreuses approches expérimentales ont fait la preuve de leur potentiel, tout particulièrement dans les maladies génétiques. Elles reposent sur des corrections d'épissages aberrants soit au moyen d'oligonucléotides modifiés, ou de molécules vectrices d'ARN normal (*trans*-épissage) [7] ou, plus largement, sur l'utilisation d'agents pharmacologiques dirigés contre certaines protéines du spliceosome. Ces agents inhibent l'épissage en général ou modulent spécifiquement l'épissage alternatif affectant ainsi un nombre réduit de gènes requis pour la progression du cancer. Plusieurs catégories de tels agents peuvent être envisagées (pour revue, voir [45, 46]) :

- des molécules ciblant spécifiquement des protéines du spliceosome comme *SF3B1* (spliceostatine, pladiénolide, meayamycine), ainsi que de nombreuses autres ;
- d'autres composés aux effets moins spécifiques sur l'épissage, comme le clotrimazole, l'indole, les dérivés de la diospyrine, ou encore les camptothécines, le butyrate ou le valproate de sodium ou le resvératrol.

Du fait du couplage entre transcription et épissage, du rôle de modifications épigénétiques sur les activités transcriptionnelles et d'épissage [47], et de l'influence de paramètres épigénétiques sur l'activité du spliceosome [48], il serait intéressant d'évaluer également le potentiel correctif de « drogues épigénétiques » additionnelles (inhibitrices des ADN méthyl-transférases par exemple).

Conclusions

Dans cette revue, nous avons rappelé des généralités sur l'épissage des ARN pré-messagers, et nous avons choisi quelques exemples illustrant l'importance d'altéra-

tions de l'activité du spliceosome dans le développement de maladies génétiques et de pathologies comme les cancers. Il est intrigant de constater qu'en dépit d'altérations très fréquentes de certains gènes jouant un rôle central dans le mécanisme d'épissage (*SMN*, *SF3B1*), les conséquences semblent souvent restreintes à un nombre réduit de gènes cibles. Pour autant, notre compréhension incomplète de l'architecture et de la dynamique de fonctionnement du spliceosome restreint encore la mise en œuvre systématique de nouvelles stratégies correctives, bien que d'impressionnants succès expérimentaux aient été obtenus. En effet, l'utilisation d'agents pharmacologiques visant certaines protéines d'épissage, comme *SF3B1*, ou encore l'efficacité corrective d'oligonucléotides vis-à-vis de mutations germinales, laissent augurer de formidables avancées dans la prise en charge d'affections héréditaires, voire de certains cancers. Les développements bio-informatiques ont été déterminants pour décrypter le fonctionnement intégré de la machinerie d'épissage, en particulier pour élaborer des prédictions robustes quant à la reconnaissance et à la sélection de sites d'épissage. Néanmoins, le répertoire des altérations de l'épissage en *cis* et en *trans* n'est pas une entité finie, même si des événements récurrents sont retrouvés. Il sera majeur de pouvoir élaborer, grâce à la biologie systémique, des prédictions sur les événements d'épissage alternatif probables, prenant en compte la structure du spliceosome, en fonction des spécificités tissulaires et des altérations pathologiques, ainsi que les variations génomiques de simples nucléotides, autrefois considérées comme silencieuses. L'élaboration d'outils permettant d'inférer, à l'échelle des transcriptomes, la structure des protéomes correspondants constituera très certainement une avancée importante pour mieux comprendre les relations génotype-phénotype [49]. ♦

SUMMARY

Pre-mRNA splicing: when the spliceosome loses ground

Pre-mRNA splicing is an obligatory step required to assemble the vast majority of mRNAs in eukaryotes. In humans, each gene gives rise to at least two transcripts, with an average 6–8 spliced transcripts per gene. Pre-mRNA splicing is not unequivocal. Variations may occur, such that splicing can become alternative, thereby participating in increasing protein variability and restricting the gap that exists between the relatively low number of genes – between 20,000 and 25,000 in humans – and the much higher number of distinct proteins – at least 100,000. In addition, although alternative pre-mRNA splicing often fulfils cell-specific needs, many aberrant splicing events can happen and lead to either hereditary or acquired diseases such as neurodegenerative diseases or cancers. In those cases, alternative splicing events may serve as disease-associated markers, or even as targets for corrective approaches. In this review, we will summarize the main aspects of regulated alternative splicing. We will present the spliceosome, a large ribonucleoprotein complex that orchestrates the splicing reactions and that was recently identified as a preferential target for mutations in several pathologies. We shall discuss some spliceosome-associated defects linked to either *cis* (i.e. on the DNA) or *trans* (e.g. in proteins) alterations of splicing machinery, like those that have been reported in genetic or acquired diseases. ♦

LIENS D'INTÉRÊT

Les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt concernant les données publiées dans cet article.

RÉFÉRENCES

- Will CL, Luhrmann R. Spliceosome structure and function. *Cold Spring Harbor Perspect Biol* 2011 ; 3.
- Hang J, Wan R, Yan C, Shi Y. Structural basis of pre-mRNA splicing. *Science* 2015 ; 349 : 1191–8.
- Bourgeois CF, Mortreux F, Auboeuf D. The multiple functions of RNA helicases as drivers and regulators of gene expression. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2016 ; 17 : 426–38.
- Turunen JJ, Niemela EH, Verma B, Frilander MJ. The significant other : splicing by the minor spliceosome. *Wiley Interdiscip Rev RNA* 2013 ; 4 : 61–76.
- Caceres JF, Kornblihtt AR. Alternative splicing : multiple control mechanisms and involvement in human disease. *Trends Genet* 2002 ; 18 : 186–93.
- Ule J, Ule A, Spencer J, et al. Nova regulates brain-specific splicing to shape the synapse. *Nat Genet* 2005 ; 37 : 844–52.
- Corcios L, Solier S. Épissage alternatif, pathologie et thérapeutique moléculaire. *Med Sci (Paris)* 2005 ; 21 : 253–60.
- Padgett RA. New connections between splicing and human disease. *Trends Genet* 2012 ; 28 : 147–54.
- Tsui LC, Dorfman R. The cystic fibrosis gene : a molecular genetic perspective. *Cold Spring Harbor Perspect Med* 2013 ; 3 : a009472.
- Matera AG, Wang Z. A day in the life of the spliceosome. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2014 ; 15 : 108–21.
- Monani UR, Lorson CL, Parsons DW, et al. A single nucleotide difference that alters splicing patterns distinguishes the SMA gene SMN1 from the copy gene SMN2. *Hum Mol Genet* 1999 ; 8 : 1177–83.
- Tanackovic G, Ransijn A, Thibault P, et al. PRPF mutations are associated with generalized defects in spliceosome formation and pre-mRNA splicing in patients with retinitis pigmentosa. *Hum Mol Genet* 2011 ; 20 : 2116–30.
- Tanackovic G, Ransijn A, Ayuso C, et al. A missense mutation in PRPF6 causes impairment of pre-mRNA splicing and autosomal-dominant retinitis pigmentosa. *Am J Hum Genet* 2011 ; 88 : 643–9.
- Lund IC, Vestergaard EM, Christensen R, et al. Prenatal diagnosis of Nager syndrome in a 12-week-old fetus with a whole gene deletion of *SF3B4* by chromosomal microarray. *Eur J Med Genet* 2016 ; 59 : 48–51.
- Shchepachev V, Wischnewski H, Missiaglia E, et al. Mpn1, mutated in poikiloderma with neutropenia protein 1, is a conserved 3'-to-5' RNA exonuclease processing U6 small nuclear RNA. *Cell Rep* 2012 ; 2 : 855–65.
- Argente J, Flores R, Gutierrez-Arumi A, et al. Defective minor spliceosome mRNA processing results in isolated familial growth hormone deficiency. *EMBO Mol Med* 2014 ; 6 : 299–306.
- He H, Liyanarachchi S, Akagi K, et al. Mutations in U4atac snRNA, a component of the minor spliceosome, in the developmental disorder MOPD I. *Science* 2011 ; 332 : 238–40.
- Reber S, Stettler J, Filosa G, et al. Minor intron splicing is regulated by FUS and affected by ALS-associated FUS mutants. *EMBO J* 2016 ; 35 : 1504–21.
- Futreal PA, Coin L, Marshall M, et al. A census of human cancer genes. *Nat Rev Cancer* 2004 ; 4 : 177–83.
- Liu J, Lee W, Jiang Z, et al. Genome and transcriptome sequencing of lung cancers reveal diverse mutational and splicing events. *Genome Res* 2012 ; 22 : 2315–27.
- Frampton GM, Ali SM, Rosenzweig M, et al. Activation of MET via diverse exon 14 splicing alterations occurs in multiple tumor types and confers clinical sensitivity to MET inhibitors. *Cancer Discov* 2015 ; 5 : 850–9.
- Supek F, Minana B, Valcarcel J, et al. Synonymous mutations frequently act as driver mutations in human cancers. *Cell* 2014 ; 156 : 1324–35.
- Sveen A, Kilpinen S, Ruusulehto A, et al. Aberrant RNA splicing in cancer ; expression changes and driver mutations of splicing factor genes. *Oncogene* 2016 ; 35 : 2413–27.
- Yoshida K, Sanada M, Shiraishi Y, et al. Frequent pathway mutations of splicing machinery in myelodysplasia. *Nature* 2011 ; 478 : 64–9.
- Damm F, Nguyen-Khac F, Kosmider O, et al. Mutations des gènes impliqués dans l'épissage dans les hémopathies malignes humaines. *Med Sci (Paris)* 2012 ; 28 : 449–53.
- Dolatshad H, Pellagatti A, Fernandez-Mercado M, et al. Disruption of *SF3B1* results in deregulated expression and splicing of key genes and pathways in myelodysplastic syndrome hematopoietic stem and progenitor cells. *Leukemia* 2015 ; 29 : 1092–103.

27. Quesada V, Conde L, Villamor N, *et al.* Exome sequencing identifies recurrent mutations of the splicing factor SF3B1 gene in chronic lymphocytic leukemia. *Nat Genet* 2012 ; 44 : 47-52.
28. Harbour JW, Roberson ED, Anbunathan H, *et al.* Recurrent mutations at codon 625 of the splicing factor SF3B1 in uveal melanoma. *Nat Genet* 2013 ; 45 : 133-5.
29. Cancer Genome Atlas N. Comprehensive molecular portraits of human breast tumours. *Nature* 2012 ; 490 : 61-70.
30. Biankin AV, Waddell N, Kassahn KS, *et al.* Pancreatic cancer genomes reveal aberrations in axon guidance pathway genes. *Nature* 2012 ; 491 : 399-405.
31. Darman RB, Seiler M, Agrawal AA, *et al.* Cancer-associated SF3B1 Hotspot mutations induce cryptic 3' splice site selection through use of a different branch point. *Cell Rep* 2015 ; 13 : 1033-45.
32. Thol F, Kade S, Schlarmann C, *et al.* Frequency and prognostic impact of mutations in SRSF2, U2AF1, and ZRSR2 in patients with myelodysplastic syndromes. *Blood* 2012 ; 119 : 3578-84.
33. Imielinski M, Berger AH, Hammerman PS, *et al.* Mapping the hallmarks of lung adenocarcinoma with massively parallel sequencing. *Cell* 2012 ; 150 : 1107-20.
34. Lovf M, Thomassen GO, Bakken AC, *et al.* Fusion gene microarray reveals cancer type-specificity among fusion genes. *Genes Chrom Cancer* 2011 ; 50 : 348-57.
35. Bai B, Hales CM, Chen PC, *et al.* U1 small nuclear ribonucleoprotein complex and RNA splicing alterations in Alzheimer's disease. *Proc Natl Acad Sci USA* 2013 ; 110 : 16562-7.
36. Fu RH, Liu SP, Huang SJ, *et al.* Aberrant alternative splicing events in Parkinson's disease. *Cell Transplant* 2013 ; 22 : 653-61.
37. Venables JP. Aberrant and alternative splicing in cancer. *Cancer Res* 2004 ; 64 : 7647-54.
38. Oltean S, Bates DO. Hallmarks of alternative splicing in cancer. *Oncogene* 2014 ; 33 : 5311-8.
39. Boise LH, Gonzalez-Garcia M, Postema CE, *et al.* bcl-x, a bcl-2-related gene that functions as a dominant regulator of apoptotic cell death. *Cell* 1993 ; 74 : 597-608.
40. Ladomery MR, Harper SJ, Bates DO. Alternative splicing in angiogenesis : the vascular endothelial growth factor paradigm. *Cancer Lett* 2007 : 249 : 133-42.
41. 2015 ; 21 : 2753-62.
42. Eswaran J, Horvath A, Godbole S, *et al.* RNA sequencing of cancer reveals novel splicing alterations. *Sci Rep* 2013 ; 3 : 1689.
43. Venables JP, Klinck R, Koh C, *et al.* Cancer-associated regulation of alternative splicing. *Nat Struct Mol Biol* 2009 ; 16 : 670-6.
44. Nihei Z, Ichikawa W, Kojima K, *et al.* The positive relationship between the expression of CD44 variant 6 and prognosis in colorectal cancer. *Surg Today* 1996 ; 26 : 760-1.
45. Zaharieva E, Chipman JK, Soller M. Alternative splicing interference by xenobiotics. *Toxicology* 2012 ; 296 : 1-12.
46. Daguenet E, Dujardin G, Valcarcel J. The pathogenicity of splicing defects : mechanistic insights into pre-mRNA processing inform novel therapeutic approaches. *EMBO Rep* 2015 ; 16 : 1640-55.
47. Lucio RF, Pan Q, Tominaga K, *et al.* Regulation of alternative splicing by histone modifications. *Science* 2010 ; 327 : 996-1000.
48. Lucio RF, Allo M, Schor IE, *et al.* Epigenetics in alternative pre-mRNA splicing. *Cell* 2011 ; 144 : 16-26.
49. Hao Y, Colak R, Teyra J, *et al.* Semi-supervised learning predicts approximately one third of the alternative splicing isoforms as functional proteins. *Cell Rep* 2015 ; 12 : 183-9.
50. De la Grange P. Altérations de l'épissage et maladies rares. *Med Sci (Paris)* 2016 ; 32 : 1111-9.

L. Corcos

sous la direction de
Houchang GULTYAROI

folies à la Salpêtrière *charcot/freud/lacan*

Association pour
la psychanalyse de la Méditerranée

editions scilicet

De l'utérus migrateur d'Hippocrate aux recherches neurologiques de Charcot. Du désir inconscient avec Freud à la jouissance du parlêtre chez Lacan... C'est à cette traversée historique et conceptuelle que nous convie cet ouvrage.

BON DE COMMANDE

Date d'expiration : | | | | | N° de contrôle au dos de la carte : | | | | | Signature :

20 €